

I contenitori innovativi per una ortofloricoltura ecocompatibile

I. INTRODUZIONE

I contenitori svolgono un ruolo di primo piano nell'ortoflorovivaismo del Paese, per il contributo che danno alle operazioni di tecnica colturale e per accompagnare alcuni prodotti commerciali come piantine di ortaggi, di fiori, di piante aromatiche pronte all'uso, di piante ornamentali erbacee, arbustacee ed arboree. I contenitori impiegati in vivaio (seminiere, cassette, contenitori alveolati, fitocelle, pannelli e cestelli portavasi e vasi di forma, dimensioni e natura diversa) svolgono parte attiva nel processo produttivo con precipui compiti di agrotecnica colturale e nella fase di vendita e utilizzazione da parte del consumatore, come è il caso delle piante aromatiche e delle ornamentali, sono richieste altre caratteristiche in termini di estetica, di durata e di sostenibilità.

L'avvento dei materiali plastici ha inciso profondamente sulla filiera del comparto determinando un netto cambiamento di tendenza, orientando gli utilizzatori verso l'uso quasi generalizzato di manufatti in materiali sintetici, leggeri, infrangibili e di facile manualità, rispetto ai tradizionali contenitori in terracotta, pesanti, fragili e di non agevole gestione, traendone indubbi vantaggi. Ma come spesso succede, anche in questo caso, il grande entusiasmo è stato presto in parte ridimensionato dall'elevato impatto ambientale di questi contenitori, in quanto, a fine utilizzazione, essi costituiscono dei rifiuti speciali da smaltire in apposite discariche. Da qui la necessità di ricercare manufatti di simile utilità, ma più compatibili con l'ambiente.

* *Dipartimento di Scienze dei Sistemi Culturali, Forestali e dell'Ambiente, Università degli Studi della Basilicata, Potenza*

La messa a punto di nuovi polimeri plastici degradabili ha aperto la strada a questa possibilità con la formulazione di manufatti che, dopo aver svolto la loro funzione, si degradino in composti organici a basso o nullo impatto ambientale. Ciò ha generato una serie di aspettative, prima fra tutte la possibilità che il contenitore degradabile possa costituire una risorsa a fine utilizzazione, anziché un rifiuto, quale fonte di materiale organico da utilizzare per il compostaggio e ritornare, quindi, a costituire un mezzo tecnico rinnovabile per l'agricoltura.

La disponibilità di nuclei plastici biodegradabili di nuova generazione idonei per essere additivati con fibre organiche naturali di origine agricola (scarti di lavorazioni agroalimentari, fibre di nocciole, di noci, di mandorle, di scarti dell'industria cerealicola, vinicola, olearia ecc.) ha aperto la strada alla preparazione di contenitori innovativi per soddisfare le esigenze del comparto ortoflorovivaistico. Tra i nuclei plastici biodegradabili, il Mater-Bi, messo a punto dalla Novamont (leader mondiale), rappresenta un poliestere attualmente meglio sfruttato per raggiungere gli obiettivi accennati. In particolare il processo tecnologico prevede diverse possibilità di miscelazione del Mater-Bi con le fibre di provenienza agricola per ottenere formulazioni idonee allo stampaggio di manufatti per iniezione, per estrusione, filmatura e termoformatura.

Una volta realizzato, il manufatto deve essere sottoposto ad una serie di verifiche per accertarne la sua validità in termini di caratteristiche meccaniche, fisico-chimiche, microbiologiche e valutarne l'idoneità al loro impiego nel processo produttivo. In merito a quest'ultimo aspetto è compito degli agronomi la realizzazione di prove di coltivazione con l'obiettivo di studiare il comportamento dei contenitori in termini di durata, di variazione delle caratteristiche durante l'impiego, di degradabilità, di adattabilità ai cicli colturali e di valutare eventuali effetti di interazione con il substrato e la pianta in essi coltivata.

Un indiscutibile vantaggio potrebbe trarne la produzione ottenuta con il metodo biologico, in quanto l'impiego dei contenitori di nuova generazione, andrebbe a sostituire quelli convenzionali, impiegati, molto spesso, in regime di deroga, nella fase iniziale del ciclo colturale di molte specie, per la carenza sul mercato di manufatti biodegradabili ammessi dal metodo.

2. POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DEI CONTENITORI BIODEGRADABILI

La necessità di disporre di contenitori biodegradabili assume particolare rilievo nell'ortoflorovivaismo per l'elevato numero di specie interessate, di piantine e di piante da preparare per anno (tabb. 1 e 2).

Il fabbisogno di piantine da orto attualmente in Italia si aggira su circa 23.038 milioni di cui 21.626 milioni per le coltivazioni di pien'aria e 1.412 milioni per le colture protette, distinte per specie così come riportato in tabella 1. A questi sono da aggiungere i contenitori impiegati nel comparto floricolo-ornamentale, che tra piantine per le attività hobbistiche, di piante da seme a fiori vivaci ed ornamentali da interno ed esterno ammontano annualmente a circa 601 milioni (tab. 2).

Il problema è di grande rilevanza per l'orticoltura di pieno campo, per i grandi numeri di piantine di cui necessita, per gli aspetti particolari della logistica legata alle diverse specie e per le inderogabili richieste della filiera del biologico in cui è giocoforza impiegare contenitori e substrati bio, così come il metodo richiede.

In particolare le orticole da trapianto interessano vaste superfici di coltivazione sia in pieno campo che in serra comprendenti specie appartenenti alle principali famiglie botaniche (composite, crucifere, cucurbitacee, liliacee, ombrellifere, solanacee ecc.) aventi spesso esigenze morfofisiologiche molto diverse. Al vivaio è demandato il compito della preparazione delle piantine con pane di terra, in bio-contenitori di volume ridotto (30-180 cm³) e di brevissima durata (40 giorni) che, una volta introdotti nel terreno, si degradino celermente, permettendo alle radici delle piante di affrancarsi senza alcuna difficoltà o crisi da trapianto.

Nel caso della preparazione delle piantine di cucurbitacee come anguria, cetriolo, melone, zucchino, al contenitore è richiesta una particolare azione di protezione degli apparati radicali durante le operazioni di trasferimento e collocazione a dimora delle stesse in quanto molto sensibili alle sollecitazioni meccaniche, con effetti negativi sulla loro crescita e sulle future produzioni. Per specie, come asparago, fragola e sedano le cui piantine si accrescono più lentamente è necessario disporre di contenitori di maggiore resistenza e più lunga durata e, nel caso dell'asparago, deve essere impenetrabile e resistente all'azione penetrante del capillizio radicale, molto invadente e numeroso, che si forma durante la prima fase di crescita delle piantine.

Nel caso della coltivazione di piante aromatiche e/o ornamentali a ciclo medio (4-6 mesi) o lungo (oltre 6 mesi), al contenitore è richiesta una maggiore durata, in sintonia con il più lungo ciclo vitale e di utilizzazione della pianta e un maggiore volume disponibile per il substrato e l'apparato radicale della stessa.

In questi casi, inoltre, specialmente quando questo deve accompagnare la pianta dal vivaio al balcone del consumatore, è richiesto, oltre che la maggiore durata, il soddisfacimento di aspetti estetici come forma, dimensione,

SPECIE ORTICOLE	PIEN'ARIA (N.)			SERRA (N.)			TOTALI
	SUPERF. (ha)	DENSITÀ PIANTE (n/m ²)	FABB. PIANTINE (MILIONI)	SUPERF. (ha)	DENSITÀ PIANTE (n/m ²)	FABB. PIANTINE (MILIONI)	FABB. PIANTINE (MILIONI)
Asparago	5.210	5	260,5	114	6	6,8	267,3
Basilico	---	---	---	191	12	22,9	22,9
Bieta da costa	2.872	8	229,8	114	8	9,1	238,9
Bieta da orto	434	10	43,4	52	10	5,2	48,6
Broccoletto di rapa	9.656	8	772,5	---	---	---	772,5
Carciofo	50.383	2	1.007,7	---	---	---	1.007,7
Cavolfiore	6.027	4	241,1	---	---	---	241,1
Cavolo broccolo	12.055	6	723,3	---	---	---	723,3
Cavolo verza	5.225	5	261,3	---	---	---	261,3
Cavolo cappuccio	4.456	6	267,4	---	---	---	267,4
Cavoli (altri)	7.811	6	468,7	---	---	---	468,7
Cavolo di Bruxelles	239	10	23,9	---	---	---	23,9
Cetriolo da mensa	1.227	3	36,8	77	2	1,5	38,3
Cipolla	12.819	12	1.538,3	---	---	---	1.538,3
Cocomero	11.438	3	343,1	1.335	3	40,1	383,2
Finocchio	23.283	10	2.328,3	28	6	1,7	2.330,0
Fragola	2.758	6	165,5	2.988	6	179,3	344,8
Indivia	11.041	8	883,3	278	6	16,7	900,0
Lattuga	17.749	12	2.129,9	3.958	10	395,8	2.525,7
Melanzana	10.130	4	405,2	1.569	3	47,1	452,3
Melone	24.822	3	744,7	3.570	2	71,4	816,1
Peperone	10.717	5	535,9	2.654	4	106,2	642,1
Pomodoro	114.391	5	5.719,6	7.961	3	238,8	5.958,4
Porro	606	8	48,5	---	---	---	48,5
Prezzemolo	1.008	16	161,3	111	12	13,3	174,6
Radicchio o cicoria	17.069	10	1.706,9	370	8	29,6	1.736,5
Sedano	3.829	8	306,3	327	6	19,6	325,9
Valeriana	---	---	---	482	6	28,9	28,9
Zucchini	13.639	2	272,8	3.689	3	110,7	383,5
Altri ortaggi	---	---	---	1.691	4	67,6	67,6
TOTALE	380.894	---	21.626,0	31.559	---	1.412,3	23.038,3

Tab. 1 *Fabbisogno di piantine di specie orticole in pien'aria ed in serra nel 2006*
Dati Istat 2006 (<http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/coltivazioni/anno2006/ital2006.htm>)

REGIONI	PIANTE DA FIORE		PIANTE DA FOGLIA		ALTRE PIANTE DA VASO		TOTALI
	IN PIEN'ARIA	IN SERRA	IN PIEN'ARIA	IN SERRA	IN PIEN'ARIA	IN SERRA	
Piemonte	5.535	1.624	230	7	331	1.068	8.795
Lombardia	56.509	3.129	13.727	215	11.609	56.625	141.814
Trentino-Alto Adige	6.220	75	14	-	3.914	398	10.621
Veneto	43.012	4.769	2.279	24	5.958	1.639	57.681
Friuli-Venezia Giulia	5.990	345	749	-	631	193	7.598
Liguria	23.141	15.234	1.209	-	6.839	46.414	92.837
Emilia-Romagna	39.714	3.553	1.466	823	751	1.742	48.049
Toscana	9.012	1.515	8.803	102	892	6.907	27.231
Umbria	276	91	21	2	6	-	396
Marche	1.669	222	155	32	252	151	2.481
Lazio	34.608	1.665	3.432	467	16.663	7.612	64.447
Abruzzo	3.865	135	133	83	1.046	264	5.526
Campania	29.259	1.372	14.660	1.556	17.264	10.514	74.625
Puglia	1.248	20	1.665	610	212	1.602	5.357
Calabria	170	86	386	-	6	3	651
Sicilia	18.212	7.993	16.841	2.554	1.141	1.331	48.072
Sardegna	464	108	66	26	300	3.590	4.554
ITALIA	278.904	41.624	65.836	6.500	67.815	140.054	600.733

Tab. 2 *Piante intere da vaso, in serra e in piena aria, per regione nel 2005 (x 000)*Dati Istat 2005 (<http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/fiori/flo42005.html>)

colore e di aspetti di natura igienica fino al completo esaurimento produttivo. La preparazione delle piantine in molte specie ortofloricole è imposta anche dal fatto che, con l'avvento delle sementi ibride di maggior costo, si preferisce preparare le piantine anziché effettuare la semina diretta in campo, per ridurre il numero di semi da utilizzare e contribuire ad abbassare i costi di produzione eliminando le operazioni molto costose di diradamento e di rincalzatura necessarie con la semina diretta.

Infine, non va sottovalutato l'aspetto che le piantine precoltivate in contenitore, con il trapianto permettono di conseguire altri vantaggi, come una migliore competizione con le infestanti, per acqua, nutrienti e luce; di ridurre il ciclo colturale di 30-40 giorni (periodo trascorso in vivaio); di sfuggire ai danni da freddo primaverili (posticipando il trapianto o trapiantando piantine di più grosse dimensioni); di abbassare i costi di produzione specialmente quando si utilizzano semi ibridi; di inglobare sostanze organiche nel bio-vaso stimolanti l'attività rizogena, la sua degradabilità e quindi migliorare la crescita della futura pianta; l'aggiunta di sostanze repellenti, di erbicidi, insetticidi

e anticrittogamici (consentiti dai disciplinari di produzione) per contribuire a risolvere problemi particolari a livello di specie e/o di cultivar.

3. ALLESTIMENTO E CONDUZIONE DI PROVE DI COLTIVAZIONE

3.1 *Il carciofo*

3.1.1 Introduzione

Il carciofo (*Cynara scolymus* L.) è una specie orticola da pieno campo in espansione nei comprensori orticoli meridionali. Attualmente in Italia occupa circa 50.000 ha, con una produzione di 537.000 t pari ad una resa unitaria di 11 t ha⁻¹. Le regioni più interessate dalla coltivazione sono: Puglia (15.800 ha), Sicilia (14.500 ha), Sardegna (13.000 ha), Campania (2.600 ha), Abruzzo (1.200 ha) e Lazio (1.100 ha), che comprendono oltre il 95% della superficie e della produzione nazionale.

Le superfici coltivate sono in crescita in Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata. Le aree litoranee costiere risultano più idonee alla coltivazione, anche perché trattasi di una pianta che non teme la salsedine e sopporta anche una discreta salinità del terreno e dell'acqua irrigua. Suoli profondi, di medio impasto, fertili, ben drenati, con pH compreso tra 6 e 7, sono ritenuti ottimi per raggiungere livelli produttivi elevati. Tradizionalmente il carciofo si propaga per carduccio o mediante altre forme agamiche diffuse a livello locale, ma da alcuni anni hanno fatto la comparsa sul mercato i primi 'semi' o acheni ibridi di nuove cultivar, messe a punto da ditte sementiere europee con brevetti israeliani e americani. Con la propagazione per 'seme', l'agrotecnica di questa pianta è destinata a subire notevoli cambiamenti, compreso l'aspetto legato alla produzione vivaistica delle piantine e alla durata del ciclo colturale. Infatti, l'impiego dell'achenio ibrido, permette di anticipare le semine in vivaio a fine inverno e di collocare a dimora in primavera le piantine con pane di terra, che, accrescendosi, hanno la possibilità di entrare in produzione in autunno e di concludere il ciclo produttivo e colturale la primavera successiva. Così facendo è possibile ridurre il ciclo del carciofo da poliennale ad annuale, con l'onere di preparare un notevole numero di piantine per anno, anche perché con la coltura a ciclo annuale si può aumentare la densità di piante. Ipotizzando che solo il 50% della superficie attualmente destinata a carciofo (tab. 3) nel giro di qualche anno fosse coltivata a ciclo annuale con piantine proveniente da 'seme', e posta una densità di 2 piante per m²,

sarebbero necessarie circa 500 milioni di piantine da ottenere in vivaio per anno. La possibilità di impiegare contenitori biodegradabili per la preparazione delle piantine, con l'opportunità che al trapianto venga interrato anche il contenitore con la piantina, apre nuove opportunità all'agrotecnica di questa pianta. Per le motivazioni appena esposte e visto l'interesse per questa specie orticola, si è stabilito di studiare la preparazione delle piantine in contenitori innovativi biodegradabili e di valutarne la produttività rispetto ai contenitori tradizionali.

3.1.2 Obiettivi

Aspetti specifici della ricerca sono stati: 1) studiare l'idoneità e il comportamento agronomico dei contenitori impiegati per l'allevamento delle piantine di carciofo a partire da acheni ibridi; 2) ricavare informazioni sul comportamento morfofisiologico delle piante di carciofo durante il ciclo colturale; 3) valutare in termini quali-quantitativi la produzione dei capolini.

3.1.3 Preparazione delle piantine

La preparazione delle piantine è avvenuta in serra presso il vivaio 'La Malfa' di Policoro (MT); sono stati impiegati i seguenti 6 contenitori: M00 Ø 6,6 cm, M02 Ø 6,6 cm, M02 Ø 12 cm, M60 rete Ø 5,5 cm, Peco Ø 11 cm e Contenitore alveolato da 91 alveoli, di cui i primi 4 di nuova formulazione realizzati per l'occasione da Organizzazione Agricoltura, come previsto dal piano di ricerca, e gli altri 2 impiegati come termini di riferimento fatti in cellulosa il tipo Peco ed in polistirolo l'altro. Tutti sono stati riempiti di substrato Floradur della Floragard avente il 60 % di sostanza organica ed un pH compreso tra 5,0 e 6,5. Sono stati impiegati acheni di carciofo della cultivar Concerto F1 messi a germinare in seminiera il 14 marzo 2005 e ripicchettati il 5 aprile nei contenitori di cui sopra, quando presentavano ben evidenti le 2 foglie cotiledonari e si vedevano le prime 2 foglie vere in fase di distensione.

3.1.4 Trapianto e schema sperimentale

Il trapianto in campo, è stato effettuato il 30 aprile 2005 con le piante allo stadio di 3^a 4^a foglia vera ben espansa, su di un terreno arato a 40 cm, fresato e

CONTENITORI	FOGLIE PER PIANTA (N.)	ALTEZZA PIANTA (CM)	LUNGHEZZA FOGLIA (CM)	LARGHEZZA FOGLIA (CM)	COLLETO Ø (MM)	LAI PER PIANTA (CM ²)	CONTENUTO S.S. (%)	GIUDIZIO SUI CONTENITORI (1)
M 60 r Ø 5,5	4	13,5	14,1	3,4	6	53	14,1	3
M 02 Ø 6,6	4	17,0	19,9	4,1	8	136	12,8	5
M 02 Ø 12	6	22,4	26,7	6,6	14	336	11,3	5
M 00 Ø 6,6	5	21,8	22,6	4,7	8	151	12,9	5
PECO Ø 11	6	23,7	26,6	9,2	11	334	12,3	5
Cont. 91 alveoli	5	16,7	17,3	3,7	7	91	15,5	4

Tab. 3 *Rilievi ed osservazioni sulle piantine di carciofo e sui contenitori al trapianto*

(1) Giudizio sulla degradazione dei contenitori: 1 = contenitore integro, 5 = contenitore completamente degradato.

concimato con 124 kg ha^{-1} di N di cui 41 sottoforma ammoniacale, 70 kg ha^{-1} di P_2O_5 e 206 kg ha^{-1} di K_2O , gestito a maggese nell'ultima annata, situato in area pianeggiante a circa 15 m s.l.m. presso l'Azienda 'Pantanello' della Regione Basilicata in agro di Bernalda. La superficie interessata dalla prova, dopo la squadratura e la posa dei cartellini, è stata assolata a 120 cm, in ciascuno dei quali sono state trapiantate le piantine collocate a 80 cm tra di loro, per realizzare una densità di 1,04 piante per m^2 ; contemporaneamente veniva predisposto l'impianto irriguo con gocciolatori con la capacità di erogare 2 lh^{-1} di acqua. In corrispondenza del trapianto, alle osservazioni effettuate in vivaio sui contenitori e sulle piantine durante la fase di crescita, si sono aggiunti i rilievi sullo stato dei contenitori e sulle piantine così come riportato in tabella 3. Alle tesi di cui sopra, al trapianto, sono state aggiunte 2 tesi per studiare gli effetti della modalità di trapianto: piantine con e senza contenitore e altre 2 per valutare l'efficacia del trattamento al colletto delle piante di una soluzione (5 cm^3) di *Trichoderma harzianum* ripetuta 20 giorni dopo in dose doppia (10 cm^3 per pianta), e nell'altra per applicare una soluzione (5 cm^3) di *Pseudomonas spp.* anch'essa da ripetere 20 giorni dopo a doppia dose, con l'intento di migliorare la microflora radicale e valutare gli effetti sulla degradabilità dei contenitori e sulla produzione dei capolini. In definitiva, la ricerca realizzata seguendo lo schema sperimentale a parcelle suddivise ripetuto 3 volte, ha visto la collocazione del tipo di contenitore nelle parcelle, le modalità di trapianto con e senza contenitore nelle sub-parcelle e i trattamenti con la soluzione fungina e batterica nelle sub-sub-parcelle di $6,72 \text{ m}^2$ ($1,2 \times 5,6 \text{ m}$), per un totale di 31 trattamenti sperimentali, considerando le piantine ottenute nei contenitori alveolati un solo trattamento.

FOGLIE VERDI PER PIANTA (N.)					
PRESENZA CONTENITORE				SENZA	CONTENITORE
CONTENITORE	TRATTAMENTO CON ACQUA	TRATTAMENTO CON SOLUZIONE BATTERICA	TRATTAMENTO CON SOLUZIONE FUNGINA	CONTENITORE	ALVEOLATO (1)
M60 rete	20,6	19,8	20,7	20,6	24,2
M02 Ø 6,6	20,5	20,0	22,2	24,9	
M02 Ø 12	21,4	21,6	21,4	24,6	
M00 Ø 6,6	21,6	19,2	19,7	22,5	
PECO 11	20,6	20,1	19,4	23,6	
LUNGHEZZA FOGLIE VERDI (CM)					
PRESENZA CONTENITORE				SENZA	CONTENITORE
CONTENITORE	TRATTAMENTO CON ACQUA	TRATTAMENTO CON SOLUZIONE BATTERICA	TRATTAMENTO CON SOLUZIONE FUNGINA	CONTENITORE	ALVEOLATO (1)
M60 rete	60,4	57,3	59,0	61,5	63,3
M02 Ø 6,6	58,6	57,6	59,5	63,0	
M02 Ø 12	62,9	61,2	60,2	64,2	
M00 Ø 6,6	51,3	50,8	58,1	62,8	
PECO 11	53,0	54,4	53,9	66,3	
LARGHEZZA FOGLIE VERDI (CM)					
PRESENZA CONTENITORE				SENZA	CONTENITORE
CONTENITORE	TRATTAMENTO CON ACQUA	TRATTAMENTO CON SOLUZIONE BATTERICA	TRATTAMENTO CON SOLUZIONE FUNGINA	CONTENITORE	ALVEOLATO (1)
M60 rete	33,3	31,1	33,8	33,8	35,0
M02 Ø 6,6	32,0	32,1	34,7	34,0	
M02 Ø 12	34,4	34,5	32,0	35,0	
M00 Ø 6,6	27,9	28,9	31,5	32,7	
PECO 11	28,4	29,6	29,0	36,5	

Tab. 4 *Rilievi morfologici effettuati il 27 luglio 2005*(1) Dato *medio* di 5 piante pre-coltivate in contenitore alveolato.

3.1.5 Conduzione della prova

Durante il ciclo colturale sono stati effettuati ripetuti interventi irrigui con cadenza settimanale, diverse sarchiature a partire dall'avvenuto attecchimento, qualche scerbatura ed è stata completata la concimazione con l'apporto di 110 kg ha^{-1} di N e 60 kg ha^{-1} di P_2O_5 in fertirrigazione. Sono stati effettuati rilievi su alcuni caratteri morfologici delle piante accompagnati da osservazioni visive per ogni tesi sperimentale a partire dall'attecchimento con intervalli di 30 giorni. Inoltre, si è reso necessario un intervento contro gli afidi con

CARATTERI PRODUTTIVI	CONTENITORI					
	ALVEOLATO	M60 RETE	MO2 Ø 6,6	MO2 Ø 12	MOO Ø 6,6	PECO 11
Capolini totali per pianta (n.)	19	21	20	18	20	22
Peso medio capolino principale (g)	175,9	179,8	170,8	180,5	163,6	185,6
Diametro equatoriale capolino (cm)	6,9	6,8	6,8	7,2	6,7	7,0
Diametro polare capolino (cm)	8,9	8,8	8,6	8,9	8,6	8,6
Capolini di scarto per pianta(n.)	0,5	0	0,2	0	0	0,3

Tab. 5 *Influenza della tipologia di contenitore impiegato su alcuni caratteri produttivi del carciofo*

pirimicarb e un trattamento con previcur ad ampio spettro contro i patogeni fungini.

Alle date del 30 maggio, 27 luglio e 14 ottobre 2005, 20 febbraio, 15 marzo 2006 su 5 piante per ogni tesi e ripetizione è stato monitorato il numero di foglie verdi, ingiallite e delle prime si determinava la loro lunghezza e larghezza. Nella tabella 4, a titolo di esempio, si riportano i dati osservati il 27 luglio 2005 relative solo alle foglie verdi.

Inoltre, il 1° luglio, sono stati prelevati alcuni vasi per ciascuna tesi sperimentale per verificare il livello di degradazione e per acquisire la documentazione fotografica.

Il 7 novembre sono state prelevate alcune piante trapiantate con il contenitore al fine di effettuare i rilievi visivi sullo stato di degradazione di questi ultimi. I risultati hanno messo in evidenza il completo disfacimento dei contenitori ridotti a piccoli brandelli e la vigoria degli apparati radicali delle piante di carciofo.

3.1.6 Dati produttivi

Le piante sono entrate in produzione nella primavera del 2006, a partire dal 30 marzo e le raccolte si sono protratte sino al 15 maggio per un totale di 9 interventi. Ad ogni raccolta e su ogni parcella sono stati rilevati i seguenti caratteri: numero e peso dei capolini principali e secondari, diametro polare ed equatoriale dei primi, numero e peso dei capolini di scarto quando presenti.

CARATTERI PRODUTTIVI	MODALITÀ DI TRAPIANTO	
	CON VASO	SENZA VASO
Capolini totali per pianta (n.)	19	20
Peso medio capolino principale (g)	183,0	176,4
Diametro equatoriale capolino (cm)	6,9	7,3
Diametro polare capolino (cm)	8,7	8,5
Capolini di scarto per pianta (n.)	0,5	0,4

Tab. 6 *Influenza della modalità di trapianto su alcuni caratteri produttivi del carciofo*

CARATTERI PRODUTTIVI	TRATTAMENTI (1)		
	NESSUNO	TRICHODERMA	PSEUDOMONAS
Capolini totali per pianta (n.)	20	19	20
Peso medio capolino principale (g)	169,7	173,0	170,4
Diametro equatoriale capolino (cm)	7,3	6,9	7,0
Diametro polare capolino (cm)	8,9	8,7	8,8
Capolini di scarto per pianta (n.)	0,2	0,5	0,4

Tab. 7 *Influenza dei trattamenti con Trichoderma harzianum e Pseudomonas spp. fluorescens su alcuni caratteri produttivi del carciofo*

(1) I trattamenti con soluzioni acquose di Trichoderma e Pseudomonas sono state applicate al trapianto (5 cm³ per pianta) e 20 giorni dopo (10 cm³ per pianta) rispettivamente.

3.1.7 Risultati

I risultati ottenuti, relativi ai capolini principali e totali per pianta sono riassunti nelle tabelle 5, 6 e 7.

3.1.8 Conclusioni

I contenitori studiati in tutti i casi non hanno influenzato i risultati produttivi del carciofo; il loro differente comportamento osservato durante la fase di preparazione delle piantine in vivaio e dopo il trapianto in campo non ha inciso sulla crescita e sviluppo delle piante che a partire da luglio presentavano un elevato grado di uniformità come hanno messo in risalto i rilievi effettuati e i livelli produttivi raggiunti. Le piante trapiantate con il contenitore non hanno mostrato sintomi di sofferenza rispetto a quelle

senza anche nei casi in cui il contenitore ha conservato più a lungo la propria integrità (M00 - 6,6). È emerso che le piantine di carciofo per l'apparato radicale invasivo di cui sono dotate contribuiscono efficacemente alla rottura e alla degradazione del contenitore anche qualora questo fosse di ostacolo o presentasse una maggiore resistenza alla sua rottura. Anche i due trattamenti con soluzioni di *Trichoderma* e *Pseudomonas* effettuati al colletto delle piante trapiantate con il contenitore, non hanno manifestato effetti significativi né sulla degradazione dei contenitori né sulla crescita, sviluppo e produttività delle piante.

3.1.9 Preparazione delle piantine

Alla luce dei risultati conseguiti il primo anno di attività, nel 2006, è stata ripetuta l'esperienza presso l'Azienda di Gaudiano di Lavello (PZ) della Regione Basilicata con l'intento di studiare due cultivar di carciofo propagate con 'semi' ibridi e di concentrare l'attenzione su due contenitori innovativi e due convenzionali. Il 16 marzo, per l'occasione, presso il vivaio orticolo della Cooperativa "Giustino Fortunato" di Lavello è stata effettuata la semina in seminiere delle due cultivar ibride (F_1): 'Concerto' già valutata nella prova precedente, e 'Opal' di nuova introduzione, ed il 29 marzo ha avuto luogo il ripicchettamento nei contenitori M02 Ø 6,6 e M60r Ø 5,5 innovativi e nei due convenzionali alveolati in polistirolo da 40 e 91 alveoli, riempiti tutti di substrato Floradur della Floragard avente il 60 % di sostanza organica ed un pH compreso tra 5,0 e 6,5.

3.1.10 Trapianto in pieno campo

Il trapianto in pien'aria, è stato effettuato il 27 aprile 2006 presso l'Azienda 'Gaudiano' sita in agro di Lavello (PZ), con le piante allo stadio di 3^a 4^a foglia vera ben espansa, su di un terreno in piano, arato a 40 cm, fresato e concimato con 124 kg ha⁻¹ di N di cui 41 sottoforma ammoniacale, 70 kg ha⁻¹ di P₂O₅ e 206 kg ha⁻¹ di K₂O. La superficie interessata dalla prova, dopo la squadratura e le operazioni di posa dei cartellini, è stata assoltata a 120 cm quindi ha fatto seguito il trapianto con le piantine, più il contenitore quando presente, collocate a 80 cm tra di loro, per realizzare una densità di 1,04 piante per m²; contemporaneamente veniva predisposto l'impianto irriguo con gocciolatori con la capacità di erogare 2 lh⁻¹ di acqua. In corrispondenza del trapianto delle

CONTENITORI	FOGLIE PER Pianta (N.)	PESO SECCO RADICI (MG)	LUN-GHEZZA FOGLIE (CM)	LARGHEZZA FOGLIE (CM)	COLLETTO Ø (MM)	LAI PER PIANTA (CM ²)	SOSTANZA SECCA FOGLIE (%)	DEGRAD. CONTENITORI (1)
Innovativi	‘Concerto’							
“M60r”	5,8	132	175	40	5,7	88	12,8	4,0
“M02 6,6”	7,0	412	210	50	6,7	164	13,0	5,0
<i>Alveolati</i>								
40 alveoli	7,0	187	200	50	6,0	120	9,3	--
91 alveoli	6,0	146	165	30	4,3	68	9,1	--
Innovativi	‘Opal’							
“M60r”	5,7	170	148	37	5,3	81	10,1	3,8
“M02 6,6”	6,3	224	187	43	6,0	134	10,6	4,5
<i>Alveolati</i>								
40 alveoli	5,0	357	143	35	5,3	93	11,9	--
91 alveoli	4,5	146	132	30	3,7	44	9,7	--

Tab. 8 *Rilievi sulle piantine di carciofo e sui contenitori al trapianto*(1) Giudizio *sulla* degradazione dei contenitori: 1= non degradati; 5= massima degradazione.

piantine provviste di vaso, alle osservazioni effettuate in vivaio sui contenitori e sulle piantine durante la fase di crescita, si sono aggiunti i rilievi sullo stato dei contenitori e sulle piantine così come riportato in tabella 8.

È stato seguito lo schema sperimentale a parcelle suddivise ripetuto 3 volte, con la collocazione del tipo di contenitore nei parcelloni e le due cultivar nelle parcelle di 22,4 m² (4,8 x 5,6 m), per un totale di 8 trattamenti sperimentali.

Durante il ciclo colturale sono state effettuate ripetute adacquate con cadenza settimanale, diverse sarchiature a partire dall'avvenuto attecchimento, qualche scerbatura ed è stata completata la concimazione con l'apporto di 110 kg ha⁻¹ di N e 60 kg ha⁻¹ di P₂O₅ in fertirrigazione dopo l'attecchimento. Successivamente sono stati effettuati altri due interventi fertirrigui somministrando, ogni volta, 40 unità di N, 50 unità di P₂O₅ e 33 unità di K₂O.

La carciofaia è entrata in produzione in primavera 2007: la prima raccolta è stata effettuata il 19 marzo e l'ultima il 27 aprile per un totale di 5 interventi. Per ciascuna raccolta è stato rilevato il numero e il peso dei capolini asportati per pianta e successivamente è stato calcolato il numero complessivo ed il loro peso medio; in corrispondenza dell'ultima raccolta dei capolini è stato

CONTENITORI	'CONCERTO'			'OPAL'		
	CAPOLINI PER Pianta (N.)	CAPOLINI PESO MEDIO (G)	DEGRADAZIO- NE CONTENI- TORI (I)	CAPOLINI PER Pianta (N.)	CAPOLINI PESO MEDIO (G)	DEGRADAZIO- NE CONTENI- TORI (I)
Innovativi						
“M60r”	20	159	5	17	145	5
“M02 6,6”	18	155	5	19	150	5
Alveolati						
40 alveoli	20	158	--	16	148	--
91 alveoli	17	154	--	19	145	--

Tab. 9 *Caratteri produttivi delle piante e giudizio sulla degradazione dei contenitori a fine ciclo*

(1) Giudizio *sulla* degradazione dei contenitori: 1= non degradati; 5= massima degradazione.

osservato il livello di degradazione dei contenitori che avevano accompagnato le piante.

3.1.11 Risultati

Dalla tabella 9 si ha modo di osservare che il numero totale di capolini prodotti per pianta ed il peso medio del capolino principale non hanno subito variazioni significative al variare dei contenitori impiegati per la preparazione delle piantine in entrambe le cultivar studiate. I contenitori innovativi interrati con le piantine al trapianto, corrispondenza dell'ultima raccolta, si presentavano completamente degradati e ridotti in brandelli sotto la pressione esercitata dagli apparati radicali delle piante durante la loro crescita e sviluppo.

3.1.12 Conclusioni generali

I risultati conseguiti nei 2 anni di ricerche permettono di fare le seguenti considerazioni:

- I contenitori innovativi studiati hanno sempre fatto osservare risultati simili o superiori a quelli conseguiti con i convenzionali (vasi Peco e contenitori alveolati).
- Quando i contenitori hanno accompagnato le piantine al trapianto non hanno ostacolato la crescita e lo sviluppo di queste ultime, né hanno sortito effetti depressivi sulla produzione e qualità dei capolini.
- Le cultivar studiate: 'Concerto' per 2 cicli e 'Opal per 1 ciclo colturale,

hanno sempre fatto osservare un elevato adattamento alla preparazione delle piantine che sono risultate simili, in termini di produttività, a quelle allevate nei contenitori alveolati anche quando il trapianto è avvenuto con le piantine in contenitore.

- L'applicazione delle soluzioni fungine e batteriche, con l'obiettivo di avere informazioni sulla decomposizione dei contenitori e sulla crescita delle piante, non hanno sortito alcun effetto su detti parametri né sulla produttività delle piante.
- I contenitori alveolati con 90 alveoli hanno prodotto piantine più piccole e meno vigorose a causa del minore volume di substrato disponibile per singola piantina con qualche effetto anche sui parametri produttivi.
- L'impiego degli acheni ibridi di carciofo, sempre più utilizzati per la propagazione di questa specie, trova nei contenitori innovativi studiati un perfetto alleato per produrre piantine di qualità ad elevato input ecologico.

3.2 *Asparago*

3.2.1 Introduzione

In Italia l'asparago (*Asparagus officinalis* L.) è coltivato su circa 6.300 ha ed assume particolare rilevanza in Veneto, Emilia Romagna, Puglia e Campania, dove si superano i 1.000 ha di coltivazione per anno. Viene effettuato in pieno campo per ottenere l'asparago verde a maturazione primaverile e in ambiente protetto per la produzione di asparago precoce bianco o violetto anche in pieno inverno. La propagazione si effettua principalmente mediante la preparazione di piantine a partire da seme, mentre il ricorso alle 'zampe' risulta sempre meno frequente per i costi più elevati da sostenere. Si impiegano contenitori alveolati in polistirolo, polipropilene (PP) e/o in polistirene ad alta densità non degradabili, che dopo la utilizzazione devono essere smaltiti in discarica. Raramente si impiegano cubetti e/o vasetti di torba precompressa o *paperpots* disponibili sul mercato e, come per altre specie, le dimensioni del contenitore influenzano la qualità della piantina al trapianto e l'attecchimento successivo.

Per contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale e per produrre asparago biologico, si è ritenuto opportuno studiare il comportamento di alcuni contenitori innovativi biodegradabili frutto dell'attività di ricerca del presente Progetto.

3.2.2 Obiettivi

Studiare l'idoneità e il comportamento agronomico dei contenitori innovativi impiegati per l'allevamento di piantine di 6 cultivar ibride di asparago a partire da semi, e di avere informazioni sul comportamento morfofisiologico delle piante di asparago durante il ciclo colturale e sulla produzione dei turioni alla raccolta.

3.2.3 Preparazione delle piantine

La preparazione delle piantine è avvenuta in serra fredda presso l'Azienda Sperimentale "Pantanello" con la semina di circa 20 g di semi in distinte seminiere per ciascuna delle 6 cultivar ibride: Eros, 'Marte', 'Erocole', 'Italo', 'UC157', 'Grande', effettuata il 9 maggio. L'emergenza si è verificata uniformemente nelle diverse cultivar dopo 10 giorni, e il 20 maggio è stato effettuato il ripicchettamento nei contenitori: M00 ø 6,6 cm; M02 ø 6,6 cm; M60 rete ø 5,5 cm; M60 100% ø 8 cm; M60 + M60/85 (50% + 50%) ø 8 cm; Contenitore alveolato, riempiti di terriccio universale. Le piantine invase sono state collocate in serra ombreggiata, irrigate con frequenza, fertilizzate e monitorate per seguirne la crescita e il comportamento dei contenitori.

3.2.4 Trapianto e schema sperimentale

Il trapianto in pien'aria è stato effettuato l'8 luglio 2005 con le piante alte 12-15 cm, di colore verde intenso, su di un terreno arato profondamente (40 cm), fresato e concimato con N nitrico ed ammoniacale, P_2O_5 e K_2O , situato in area pianeggiante a circa 15 m slm presso l'Azienda Agricola Sperimentale "Pantanello" della Regione Basilicata in agro di Bernalda. La superficie interessata dalla prova, dopo la squadratura e le operazioni di posa dei cartellini, è stata assolata con solchi 35 cm profondi e 100 cm distanti tra loro; le piantine, con cura, sono state collocate a 30 cm tra di loro, per realizzare una densità di 2,86 piante per m^2 ; contemporaneamente veniva predisposto l'impianto irriguo costituito da manichette con gocciolatori con la capacità di erogare 2 lh^{-1} di acqua. In corrispondenza del trapianto, alle osservazioni effettuate in vivaio sui contenitori e sulle piantine durante la fase di crescita, si sono aggiunti i rilievi sulle piantine così come riportato nelle tabelle 10 e 11. Al momento del collocamento a dimora delle piantine con il contenitore

TIPO CONTENITORE	CULTIVAR: ALTEZZA PIANTE (CM)						CULTIVAR: DIAMETRO COLLETT0 (MM)					
	EROS	MARTE	ERCOLE	ITALO	UCI 57	GRANDE	EROS	MARTE	ERCOLE	ITALO	UCI 57	GRANDE
M60 rete	12,0	14,9	14,0	10,7	10,5	12,5	2	1	2	1	2	3
M02-6,6	16,5	13,8	13,5	12,0	9,8	11,9	2	2	1	1	2	2
M60 100%	16,7	15,2	12,8	10,0	11,8	16,2	1	2	1	1	3	3
M00-6,6	17,3	13,8	16,8	11,5	12,4	12,8	2	2	1	1	2	2
M60+M60/85	12,5	16,3	11,5	12,1	10,5	14,5	2	3	1	3	1	2
Cont.Alveolato	10,0	17,0	15,2	11,0	11,3	10,8	2	2	2	2	2	1
Medie	14,2	15,2	14,0	11,2	11,1	13,1	2	2	1	2	2	2

Tab. 10 Rilevi dell'altezza e del diametro del colletto delle piantine nelle cultivar al trapianto (08/07/2005)

TIPO CONTENITORE	CULTIVAR: SOST. SECCA STELI E FOGLIE (%)						CULTIVAR: SOST. SECCA RADICI (%)					
	EROS	MARTE	ERCOLE	ITALO	UCI57	GRANDE	EROS	MARTE	ERCOLE	ITALO	UCI57	GRANDE
M60 r	29,3	28,7	24,5	30,0	28,9	29,6	18,4	21,3	22,1	21,2	23,3	23,1
M02-6,6	32,3	29,2	23,1	27,6	29,7	29,7	20,2	21,7	22,6	23,5	19,2	21,0
M60100%	28,4	29,7	26,1	26,1	29,7	31,1	23,2	24,1	23,7	24,4	23,0	19,9
M00-6,6	27,0	23,6	31,2	31,7	31,0	28,2	25,1	19,8	19,1	17,8	21,9	23,1
M60+M60/85	35,5	29,6	28,9	28,1	29,0	31,9	24,4	16,9	24,7	21,7	23,3	19,8
Conten.Alveolato	24,0	31,2	28,9	35,4	31,1	27,9	17,2	19,9	21,2	20,9	27,9	21,6
Medie	29,4	28,7	27,1	29,8	30,0	29,7	21,4	20,6	22,2	21,6	23,1	21,4

Tab. 11 Sostanza secca degli steli e foglie, e delle radici delle piantine al trapianto (08/07/2005)

si è stabilito di studiare anche l'effetto dell'assenza di contenitore limitatamente alle cultivar Eros e 'Marte'. In definitiva è stato realizzato lo schema sperimentale a parcelle suddivise ripetuto 3 volte, con la collocazione delle cultivar nelle parcelle e il tipo di contenitore nelle sub-parcelle di 2,40 m², a cui si sono aggiunti altri 10 trattamenti (2 cultivar trapiantate senza i 5 tipi di contenitore) per un totale di 46 trattamenti sperimentali.

3.2.5 Conduzione della prova

Durante i primi tre cicli colturali di formazione delle piante, sono state effettuate ripetute adacquate estive con cadenza settimanale, diverse sarchiature, qualche scerbatura ed è stato apportato concime azotato, fosfatico e potassico in fertirrigazione per potenziarne l'accrescimento. Sono stati effettuati ripetuti rilievi sulle dimensioni delle piante per ogni tesi sperimentale a partire dall'attecchimento con intervalli mensili. Durante l'attività vegetativa delle piante, si è reso necessario qualche intervento contro gli afidi con pirimicarb e con previcur contro i patogeni fungini.

L'asparagiaia è stata sottoposta alla normale agrotecnica di coltivazione negli anni 2006 e 2007 ed è entrata in produzione nella primavera 2008, a partire dalla prima settimana di marzo.

3.2.6 Risultati

L'altezza delle piantine all'epoca del trapianto oscilla, in media, tra gli 11,1 cm di 'UC157' e i 15,2 cm di 'Marte'. Nelle altre cultivar si osservano valori intermedi (tab. 10). Rispetto alla tipologia del contenitore, l'altezza delle piante, varia in modo differente con la cultivar. Le piantine più alte si osservano con la cultivar Eros allevate in M60 100%, con la cultivar Marte nel contenitore alveolato, con 'Erocole' in M00 6,6, con 'Italo' in M60 + M60/85, con UC157 in M00 6,6 e con la cultivar Grande in M60 100%.

Il diametro del colletto delle piantine risulta poco variabile tra le cultivar e tra il diverso tipo di contenitore impiegato (tab. 10).

Il contenuto di sostanza secca degli steli e delle foglie risulta del 29,1%, rispetto al 21,7% delle radici, in media, tra le cultivar; in entrambi i casi la percentuale di secco varia notevolmente al variare della tipologia di contenitore impiegato (tab. 11).

Durante i primi tre cicli colturali di formazione delle piante, inoltre sono

TIPO CONTENITORE	EROS		MARTE		ERCOLE	ITALO	UC 157	GRANDE
	S(1)	V(2)	S(1)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)
M60 rete	40,2	42,5	41,3	40,6	39,8	48,1	37,5	41,7
M02-6,6	33,8	36,0	50,3	39,4	30,2	44,7	44,8	47,1
M60 100%	48,6	30,8	34,7	31,8	24,3	40,1	27,5	39,8
M00-6,6	40,6	37,6	47,4	34,8	27,6	52,1	36,3	39,9
M60+M60/85	49,4	24,8	59,7	31,1	28,2	39,6	28,6	29,5
C. alveolato	41,9	-	37,5	-	33,8	46,2	36,8	38,9
Medie	42,4	34,3	45,2	35,5	30,7	45,1	35,3	39,5

Tab. 12 *Altezza media degli steli (cm) (fine 1° ciclo)*

(1) (S) trapianto senza contenitore

(2) (V) trapianto con contenitore

TIPO CONTENITORE	EROS		MARTE		ERCOLE	ITALO	UC 157	GRANDE
	S(1)	V(2)	S(1)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)
M60r	158,7	159,8	148,8	157,9	161,7	154,4	158,4	154,6
M02-6,6	159,7	160,9	153,0	160,8	162,4	155,8	159,0	149,3
M60 100%	147,5	160,1	158,7	158,9	162,3	156,1	161,0	148,2
M00-6,6	151,2	161,3	159,8	158,3	164,4	151,0	158,1	157,1
M60+M60/85	155,3	155,6	152,6	165,0	153,0	157,8	162,8	162,0
C. alveolato	156,1	-	149,7	-	155,9	154,9	155,3	164,0
Medie	154,8	159,5	153,8	160,2	160,0	155,0	159,1	155,9

Tab. 13 *Altezza media degli steli (cm) (31/07/06)*

(1) (S) trapianto senza contenitore

(2) (V) trapianto con contenitore

stati eseguiti diversi rilievi su alcuni caratteri morfologici delle piante; a titolo di esempio si riportano quelli effettuati nel 2006 e 2007 relativi all'altezza e al numero di steli per pianta così come riportati nelle tabelle 12 e 13.

L'altezza media degli steli alla fine del primo anno del ciclo colturale (tab. 12) presenta una flessione soprattutto nella cultivar Ercole con un minimo di 24,3 cm quando trapiantata con il contenitore M60 100%; mentre le cultivar Marte ed 'Italo' sono quelle che presentano gli steli più alti, con la differenza che la prima presenta la maggiore altezza con le piante trapiantate senza vaso e la 'Italo' in presenza del contenitore. Mediamente l'altezza risulta essere più elevata nel contenitore M60 r, anche se non mancano casi in cui detto parametro assume valori elevati in altri contenitori a parità di cultivar. Alla data del 31 luglio 2006 (tab. 13) detto parametro fa rilevare valori più elevati

TIPO CONTENITORE	EROS		MARTE		ERCOLE	ITALO	UC I 57	GRANDE
	S(1)	V(2)	S(1)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)
M60r	168,8	169,8	168,1	177,0	171,7	174,9	178,4	174,2
M02-6,6	169,1	171,9	173,2	170,8	172,9	175,8	179,0	169,3
M60 100%	167,5	170,1	168,4	178,2	182,3	176,1	181,0	168,2
M00-6,6	161,2	172,3	169,8	178,3	174,9	181,0	178,1	167,1
M60+M60/85	165,4	175,6	172,6	175,0	183,0	177,8	182,3	172,4
C. alveolato	166,8	-	169,1	-	175,9	164,9	175,2	164,9
Medie	166,5	171,9	170,2	175,9	176,8	175,1	179,0	169,4

Tab. 14 *Altezza media degli steli (cm) (31/07/'07)*

(1) (S) trapianto senza contenitore

(2) (V) trapianto con contenitore

TIPO CONTENITORE	EROS		MARTE		ERCOLE	ITALO	UC I 57	GRANDE
	S(1)	V(2)	S(1)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)
M60r	6,5	6,4	6,8	6,8	6,5	5,9	7,2	6,5
M02-6,6	7,1	5,3	6,5	5,8	7,0	5,8	6,7	6,4
M60 100%	6,0	6,8	6,8	6,5	6,6	6,7	5,9	5,8
M00-6,6	6,7	5,5	5,6	5,9	6,6	7,6	6,3	5,9
M60+M60/85	6,1	7,8	6,3	7,3	5,9	6,6	6,8	7,4
C. alveolato	7,3	-	5,7	-	6,8	6,6	5,7	6,4
Medie	6,6	6,4	6,3	6,5	6,6	6,5	6,4	6,4

Tab. 15 *Accestimento (steli per pianta n.) (31/07/'06)*

(1) (S) trapianto senza contenitore

(2) (V) trapianto con contenitore

con la piantine trapiantate con il contenitore per le cultivar Eros e 'Marte', dove è possibile effettuare questo confronto, ma anche le piantine delle altre cultivar trapiantate con il contenitore presentano valori del tutto comparabili. Andamento simile si osserva il 31 luglio 2007 (tab. 14), con valori in generale più alti per l'ulteriore accrescimento delle piante (terzo anno di ciclo) e con la conferma che quando il contenitore accompagna la piantina al trapianto, la futura pianta ne trae un certo vantaggio.

Per quanto riguarda l'accestimento (tabb. 15 e 16), si osserva un incremento del numero di steli per pianta passando dal secondo al terzo anno di ciclo senza sostanziali differenze tra le cultivar, i diversi contenitori impiegati e le 2 modalità di trapianto delle cultivar Eros e 'Marte'.

In primavera 2008 l'asparagiaia è entrata in produzione e alla data del 15 aprile sono state effettuate 5 raccolte (tab. 17) asportando in media 6-7 turioni commerciabili per pianta senza differenze di rilievo tra le cultivar e i

TIPO CONTENITORE	EROS		MARTE		ERCOLE	ITALO	UC 157	GRANDE
	S(1)	V(2)	S(1)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)
M60r	11,5	9,4	10,8	10,8	10,5	10,9	9,2	12,5
M02-6,6	12,1	10,3	11,5	9,8	9,7	9,8	10,7	11,4
M60 100%	10,0	12,8	12,8	9,5	10,6	9,7	11,9	9,8
M00-6,6	9,7	11,5	9,6	10,9	11,6	11,6	9,6	9,9
M60+M60/85	10,1	10,8	9,3	10,3	12,9	10,6	10,8	11,4
C. alveolato	13,3	-	11,7	-	9,8	9,6	10,7	10,6
Medie	11,1	11,0	11,0	10,3	10,9	10,4	10,5	10,9

Tab. 16 *Accestimeno (steli per pianta n.) (31/07/07)*

(1) (S) trapianto senza contenitore

(2) (V) trapianto con contenitore

TIPO CONTENITORE	EROS		MARTE		ERCOLE	ITALO	UC 157	GRANDE
	S(1)	V(2)	S(1)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)	V(2)
M60r	5	6	6	5	6	8	6	7
M02-6,6	6	4	5	4	4	7	7	6
M60 100%	7	5	7	6	7	6	9	5
M00-6,6	7	6	7	5	8	7	5	6
M60+M60/85	6	8	5	5	5	6	6	7
C. alveolato	8	-	6	-	8	7	9	5
Medie	7	6	6	5	6	7	7	6

Tab. 17 *Turioni commerciabili per pianta (n.) raccolti al 15 aprile 2008*

(1) (S) trapianto senza contenitore

(2) (V) trapianto con contenitore

contenitori impiegati per ottenere le piantine. Alla stessa data dai rilievi effettuati alla base delle piante è emerso la completa degradazione dei contenitori e la presenza dei rizomi ricchi di gemme ed in piena espansione.

3.2.7 Conclusioni

In conclusione si può ritenere che i contenitori proposti per la preparazione delle piantine di asparago risultano idonei al raggiungimento degli obiettivi in quanto, sebbene i dati produttivi siano del tutto parziali, ma il comportamento delle piante, la loro vigoria e la completa degradazione dei contenitori quando hanno accompagnato le piantine al trapianto,

fanno intravedere un loro possibile impiego nella produzione vivaistica futura per questa specie. In particolare è da sottolineare come la degradazione dei contenitori dopo il trapianto sembra contribuire ad un migliore accrescimento dei rizomi delle piante con effetti sulla loro vigoria e sulla futura produttività (aspetti da verificare con il prosieguo del ciclo produttivo appena iniziato).

3.3 *Melone*

3.3.1 Introduzione

Nell'ambito delle cucurbitacee, il melone (*Cucumis melo* L.) nelle sue 3 principali (varietà botaniche): inodorus (*C. melo* L. var. *inodorus* Naud.), retato (*C. melo* L. var. *reticulatus* Naud.) e cantalupo (*C. melo* L. var. *cantalupensis* Naud.), interessa annualmente in Italia circa 27.000 ha di coltivazione con una produzione che sfiora le 560.000 t. Principalmente si pratica la semina diretta in campo per il tipo inodorus e si preferisce preparare le piantine per le altre 2 tipologie specialmente per le coltivazioni semiforzate e forzate. Si stima che annualmente per questa specie si preparano circa 816 milioni di piantine (tab. 8) facendo ricorso a contenitori alveolati in polistirolo, in polipropilene (PP), a vasetti di torba, a paperpots ecc. Da più parti si avverte l'esigenza di disporre di contenitori degradabili tali che possano accompagnare le piantine in campo con il trapianto e disfarsi nel terreno senza arrecare nocuenti agli apparati radicali e alla crescita e sviluppo delle piante. Anche il diffondersi della coltivazione con il metodo biologico della specie impone l'adozione di contenitori bio per preparare le piantine. Questi aspetti ci hanno indotti ad affrontare la ricerca di contenitori innovativi a basso impatto ambientale per destinarli alla preparazione delle piantine di melone.

3.3.2 Obiettivi

Studiare l'idoneità e il comportamento agronomico dei contenitori impiegati per l'allevamento di piantine di melone, di avere informazioni sul comportamento morfofisiologico delle piante di melone durante il ciclo colturale e di valutare in termini quali-quantitativi la produzione dei frutti alla raccolta.

CONTENITORI	CARATTERISTICHE				
	MATERIALE	FORMA	DIAMETRO		ALTEZZA (cm)
			SUPERIORE (cm)	INFERIORE (cm)	
"M 60" ⁽²⁾	Poliestere biodegradabile parzialmente di origine rinnovabile	Tronco-conica	5,5	4,0	4,0
"M02"	Poliestere biodegradabile parzialmente di origine rinnovabile, caricato con fibra vegetale (20 %)	Tronco-conica	6,6	5,0	7,0
"M60+M60/85"	Poliestere biodegradabile parzialmente di origine rinnovabile (maggiore fluidità)	Tronco-conica	8,0	5,5	5,5
"M00"	Poliestere biodegradabile parzialmente di origine rinnovabile di 1° tipo	Tronco-conica	6,6	5,0	7,0
"M60 8"	Poliestere biodegradabile parzialmente di origine rinnovabile	Tronco-conica	8,0	5,5	5,5
Contentitore alveolato da 91 alveoli	polistirolo	Tronco-conica	3,9	2,6	5,7
					46 ⁽¹⁾

Tab. 18 *Tipologie di contenitori impiegati nella preparazione delle piantine di melone in vivaio*

(1) Volume del singolo alveolo.

(2) r = contentitore a rete.

3.3.3 Preparazione delle piantine

La preparazione delle piantine di melone (*Cucumis melo* L. var. *inodorus* Naud.) è avvenuta in serra fredda presso l'Azienda Agricola Sperimentale "Pantanello" con la prima semina effettuata il 24 maggio e la seconda il 15 giugno, collocando 2 semi in ciascuno dei tipi di contenitori: M60 r, M02-6,6, M60 100%, M00-6,6, M60 + M60/85, e contenitore alveolato da 90 alveoli, riempiti di terriccio universale "Floradur" costituito da una miscela di torba bruna e bionda ed avente un contenuto di sostanza organica del 60 % e un pH di 6,0 - 6,5.

È stato usato il seme della cv Cocorito F1 (Seminis Italia) indicata come genotipo resistente all'oidio. Dopo l'emergenza è stato effettuato l'isolamento riducendo le piante a una per contenitore avendo cura di lasciare quella più verde e vigorosa. Dopo 20 e 16 giorni dalla semina rispettivamente per la prima e la seconda epoca, le piantine erano pronte per il trapianto, avvenuto su di un terreno opportunamente preparato, situato in area pianeggiante a circa 15 m slm presso l'Azienda Agricola Sperimentale "Pantanello" della Regione Basilicata, caratterizzato da una tessitura a grana media (51,3 % limo, 29,0 % sabbia e 19,7% argilla), una reazione leggermente alcalina (pH 7,68), un basso contenuto in azoto totale (0,8 g/kg,) ed un contenuto in sostanza organica pari a 9,2 g/kg; inoltre, risultava ben dotato in fosforo (21,2 mg/kg) e potassio scambiabile (215 mg/kg). La superficie interessata dalla prova, dopo la squadratura e le operazioni di posa dei cartellini, è stata assoltata con solchi 5 cm profondi e 200 cm distanti tra loro e le piantine, con cura, sono state collocate a 100 cm tra di loro, per realizzare una densità di 0,5 piante per m²; contemporaneamente veniva predisposto l'impianto irriguo costituito da ali gocciolanti con la capacità di erogare 2 l h⁻¹ di acqua per gocciolatore.

3.3.4 Trapianto e schema sperimentale

Il trapianto è stato effettuato considerando, per ogni contenitore innovativo, due modalità di posa a dimora delle piantine: con e senza il contenitore. Pertanto, per ogni epoca di trapianto, la prova ha previsto il confronto di 11 tesi sperimentali ottenute dalla combinazione fattoriale di 5 contenitori innovativi con due modalità di trapianto, e dall'aggiunta della tesi convenzionale (contenitore alveolato) che prevedeva, ovviamente, una sola modalità di trapianto, ovvero la collocazione nel terreno della piantina senza il contenitore. Le suddette tesi sono state distribuite in campo seguendo lo schema

CONTENITORI	INDICE DI DEGRADAZIONE CONTENITORI (l)		ALTEZZA PIANTE (cm)		FOGLIE VERE PER PIANTA (n.)		SUPERFICIE FOGLIARE PER PIANTA (cm ²)		PESO FRESCO PARTE EPIGEA PER PIANTA (g)		SOSTANZA SECCA EPIGEA (%)	
	DATE DI TRAPIANTO											
	13/06	01/07	13/06	01/07	13/06	01/07	13/06	01/07	13/06	01/07	13/06	01/07
“M 60r 5,5”	0,2	0,0	5,5	5,3	2,2	1,9	52	45	2,0	1,8	13,8	13,9
“M02 6,6”	0,3	0,1	5,2	5,5	2,0	2,0	96	106	3,6	4,1	13,9	13,8
“M60 8”	0,0	0,0	6,4	6,2	1,9	2,0	124	121	4,3	4,0	13,6	12,4
“M00 6,6”	0,0	0,0	6,0	5,8	2,1	2,2	100	108	4,2	3,9	13,7	13,5
“M60+M60/85”	0,0	0,0	6,8	5,9	2,2	2,1	123	113	4,5	4,0	12,8	13,4
Cont. alveolato	-	-	5,0	5,3	2,0	1,9	41	50	1,7	1,5	12,1	13,1
MDS 0,05 P (2)	n.s	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	30	42	1,0	1,3	n.s	n.s
0,01 P												

Tab. 19 *Indice di degradazione dei contenitori e alcuni parametri biometrici delle piantine di melone al momento del trapianto (13/06 e 01/07/2005)*

1) 0 = Contenitori non degradati; 5 = contenitori completamente degradati.

2) MDS = Minima differenza significativa.

CONTENITORI	MODALITÀ DI TRAPIANTO (1)	PRODUZIONE COMMERCIBILE		CARATTERISTICHE DEI FRUTTI										PLACCENTE E SEMI (%)	SOLIDI SOLUBILI (°Brix)	CONSISTENZA (%)	SOSTANZA SECCA (%)
		PER PIANTA (n.)	(t/ha)	PESO MEDIO MEDIO (g)	DIAMETRO		INDICE DI FORMA (L/l)	SPessore PERICARPO (mm)	CAVITÀ OVARICA		INDICE DI FORMA (L/l)						
					EQUATORIALE "L" (cm)	POLAIRE "L" (cm)			LARGHEZZA "L" (cm)	LUNGHEZZA "L" (cm)							
"M 60r"	SV	3,0	31,0	1888	14,4	22,4	1,6	5,2	5,2	14,5	2,8	6,9	12,0	4,0	10,9		
	V	3,0	31,1	1997	13,7	22,6	1,6	3,5	5,6	15,1	2,7	7,2	11,9	3,5	10,6		
"M02"	SV	3,7	32,2	2015	14,5	22,4	1,5	3,3	5,7	14,3	2,5	6,8	12,6	3,9	10,3		
	V	3,3	31,8	1849	13,8	22,4	1,6	3,6	5,5	14,9	2,7	7,0	11,8	3,4	9,9		
"M60 8"	SV	3,5	31,7	1840	13,9	21,6	1,5	5,5	5,5	14,6	2,6	7,4	12,4	4,5	9,4		
	V	3,0	26,8	1679	13,5	20,2	1,5	4,7	5,6	14,1	2,5	6,9	12,8	3,7	8,9		
"M00"	SV	2,8	36,0	2131	14,6	22,5	1,5	3,8	5,6	14,8	2,6	6,7	11,4	3,7	9,3		
	V	2,6	29,5	1961	14,0	22,4	1,6	4,7	5,0	14,2	2,8	7,0	11,1	4,3	8,0		
"M60 + M60/85"	SV	3,0	33,2	1998	14,3	21,7	1,5	5,2	5,7	14,0	2,4	6,5	12,3	3,1	10,5		
	V	3,1	26,4	1709	14,2	20,7	1,5	5,0	5,2	14,8	2,8	6,9	12,0	4,0	8,5		
Contentitore alveolato		3,0	26,1	1703	13,6	20,9	1,5	4,8	5,3	14,2	2,7	7,3	11,8	3,1	10,2		
SECONDA EPOCA DI TRAPIANTO (01/07/2005)																	
"M 60r"	SV	3,8	25,1	1816	13,9	19,6	1,4	6,3	5,9	13,3	2,3	6,2	10,7	2,9	9,4		
	V	3,1	19,5	1705	12,8	21,3	1,7	5,7	4,7	13,6	2,9	8,0	10,7	3,0	8,9		
"M02"	SV	3,7	30,0	2139	14,0	21,5	1,5	6,2	5,7	14,4	2,5	6,6	11,7	2,6	9,3		
	V	2,7	18,1	2219	13,3	22,3	1,7	5,7	5,8	16,2	2,8	7,3	10,4	3,2	9,5		
"M60 8"	SV	3,6	31,9	2020	14,0	21,2	1,5	5,1	5,0	14,1	2,8	6,4	12,9	3,0	10,6		
	V	3,2	21,0	1794	12,5	20,0	1,6	6,5	4,8	13,0	2,7	8,0	9,5	2,5	9,0		
"M00"	SV	3,9	27,9	2014	13,7	21,3	1,5	6,5	4,8	15,5	3,2	6,1	11,8	2,1	10,2		
	V	2,8	16,1	1656	12,7	19,9	1,6	6,0	5,5	14,1	2,6	9,1	9,9	3,0	8,9		
"M60 + M60/85"	SV	4,0	35,3	2298	15,3	23,3	1,5	7,7	6,3	17,2	2,7	5,7	10,7	2,1	10,0		
	V	3,2	23,5	1893	13,5	21,1	1,6	5,5	4,8	13,4	2,8	6,5	11,0	3,8	10,0		
Contentitore alveolato		3,1	18,1	1772	12,8	23,9	1,9	5,9	4,8	14,5	3,0	7,5	9,8	2,7	9,1		
MDS ⁽²⁾	0,05P	0,5	3,9	338	0,9	1,9	0,12	0,9	0,5	1,5	0,3	n.s.	0,8	n.s	0,9		
	0,01P	0,7	5,3	453	-	2,5	0,16	1,2	0,7	2,1	0,4	1,1	1,1		1,3		

Tab. 20 *Influenza del tipo di contenitore e della modalità di trapianto su alcune caratteristiche produttive e qualitative del melone allevato in pieno campo*

(1) SV = trapianto senza vaso; V = trapianto con vaso

(2) MDS = Minima differenza significativa

sperimentale a blocchi randomizzati con 3 repliche. Le parcelle elementari avevano una superficie di 14 m² corrispondenti a 7 piante. Al trapianto sono stati effettuati rilievi visivi sullo stato dei contenitori (degradazione) assegnando un punteggio secondo una scala crescente di valori variabile da 0 (materiale completamente intatto, perfetta tenuta del contenitore) a 5 (materiale completamente degradato, scarsa tenuta del contenitore); tale rilievo è stato ripetuto a fine ciclo colturale ispezionando gli apparati radicali delle piante che erano state messe a dimora con il vasetto. Durante i due cicli colturali sono state effettuate ripetute adacquate con cadenza settimanale, diverse sarchiature a partire dall'avvenuto attecchimento, qualche scerbatura e sono stati apportati 100 kg ha⁻¹ di N, 150 kg ha⁻¹ di P₂O₅ e 200 kg ha⁻¹ di K₂O in fertirrigazione dopo l'attecchimento e in più riprese. Si sono resi necessari trattamenti fitosanitari per il controllo di fitofagi (afidi, tripidi e acari) e crittogame (oidio). Le raccolte dei frutti sono state effettuate, per ciascuna epoca di trapianto, in unica soluzione, rispettivamente il 30 agosto ed il 30 settembre 2005; sono stati asportati tutti i frutti maturi considerando un'area di saggio di 10 m² per parcella corrispondenti a 5 piante. Successivamente, i peponidi sono stati classificati in commerciabili e di scarto e pesati; in laboratorio, su campioni di 5 frutti commerciabili per parcella sono stati rilevati i seguenti caratteri morfologici e qualitativi: peso medio e dimensioni (diametro polare ed equatoriale) dell'intero frutto e della cavità ovarica (larghezza e lunghezza); peso delle placente e semi; solidi solubili (°Brix), sostanza secca e consistenza della polpa; spessore del pericarpo.

Tutti i dati rilevati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) considerando come causa di variazione principale congiuntamente le due epoche di semina o di trapianto, come sub-effetto i diversi contenitori e come sub-sub-effetto le modalità di trapianto ad eccezione delle piantine allevate nei contenitori alveolati. Le differenze tra i valori medi risultati statisticamente significativi sono stati valutati con il test della minima differenza significativa (MDS).

Dalla tabella 19 emerge la buona tenuta dei contenitori sino al momento del trapianto, solo le tipologie M 60 r e M02 presentavano un chiaro inizio di degradazione specialmente con la prima epoca di semina. I caratteri biometrici delle piantine non presentavano differenze degne di rilievo e la maggiore superficie fogliare e il più elevato peso della parte epigea delle piantine osservato con alcuni di essi è da attribuire al loro maggiore volume e quindi al maggiore quantitativo di substrato disponibile per pianta. Ciò spiega anche la ridotta crescita delle piantine nel contenitore alveolato i cui alveoli presentavano il volume più basso (46 cm³).

CONTENITORI	INDICE DI DEGRADAZIONE (i)	
	PRIMA EPOCA	SECONDA EPOCA
M 60 rete Ø 5,5	2,5	2,7
M02 Ø 6,6	4,7	4,5
M60+M60/85 Ø 8	0,5	0,4
M00 Ø 6,6	0,8	0,8
M60 Ø 8	0,5	0,5
Contenitore alveolato	-	-

Tab. 21 *Indice di degradazione dei contenitori a fine ciclo culturale*

(1) 0 = Materiale non degradato; 5 = completamente degradato.

3.3.5 Risultati

Dalla tabella 20 si evince che le piante di melone con la prima epoca di trapianto hanno prodotto in media $30,5 \text{ tha}^{-1}$ di peponidi commerciabili, con la differenza che quando le piantine erano liberate dal contenitore al momento del trapianto, si è registrato un decremento produttivo di $3,7 \text{ tha}^{-1}$ passando da $32,8 \text{ tha}^{-1}$ a $29,1 \text{ tha}^{-1}$ quando il contenitore ha accompagnato la piantina a dimora; detta differenza risulta anche chiara nei confronti delle piantine allevate nei contenitori alveolati. Considerando la diversa tipologia di contenitore, emerge che questi, in tutti i casi, hanno favorito gli aspetti produttivi del melone (31 tha^{-1}) nei confronti delle piantine ottenute con i contenitori alveolati ($26,1 \text{ tha}^{-1}$). In particolare la presenza del contenitore dopo il trapianto ha, in un certo modo, sortito effetti negativi sulla produttività con l'impiego dei contenitori M60, M00 e in quelli M60+M60/85. La presenza del contenitore in questi casi, ha probabilmente creato ostacoli al pieno funzionamento degli apparati radicali delle piante, che, come si evince anche dalle dimensioni degli steli, dalla fogliosità delle piante e dalla documentazione fotografica, i contenitori in queste tesi, si presentavano più integri rispetto agli altri in studio.

Con la seconda epoca di trapianto si osserva in media una produzione di $21,9 \text{ tha}^{-1}$ di peponidi, $19,6 \text{ tha}^{-1}$ con il trapianto delle piantine con vaso e $30,1 \text{ tha}^{-1}$ senza vaso, e $18,1 \text{ tha}^{-1}$ con le piantine allevate in contenitore alveolato. Detti risultati, più bassi di quelli relativi alla prima epoca, confermano gli stessi andamenti, anzi nel caso delle piantine trapiantate senza contenitore, queste hanno prodotto $10,5 \text{ tha}^{-1}$ di peponidi in più rispetto a quelli con contenitore, facendo rilevare un incremento del 53,4%, rispetto al 12,6% osservato con la prima epoca; mentre le piantine allevate in contenitore alveolato hanno confermato il minore livello produttivo.

3.3.6 Comportamento dei contenitori

Le difficoltà incontrate dalle radici con la presenza del contenitore sono risultate più evidenti nella seconda epoca variabilmente con tutti i tipi di contenitore a confronto.

A fine ciclo, come si evince dalla tabella 21, tutti i contenitori presentavano evidenti sintomi di degradazione particolarmente evidenti nei contenitori M60 r, M02 e M00 in cui detto processo era iniziato già prima del trapianto (tab. 19). I risultati positivi conseguiti con i contenitori innovativi meritano un ulteriore approfondimento per meglio focalizzare la messa a punto di manufatti più facilmente degradabile per ridurre gli ostacoli agli apparati radicali quando si opera il trapianto con il contenitore.

3.3.7 Conclusioni

Da quanto sin qui esposto emerge con evidenza la difficoltà che le piante di melone incontrano per liberarsi dalle angustie causate dai diversi contenitori agli apparati radicali dopo il trapianto. Gli effetti depressivi sulla produttività delle piante causato dall'ostacolo alla regolare crescita del fittone radicale quando il contenitore accompagna la pianta con il trapianto necessita di ulteriori approfondimenti orientando l'attenzione verso contenitori di più breve durata e di più immediata degradabilità dopo il trapianto, come in parte emerge dalla tipologia M60 r, M02 e M00.

Non va, in ogni caso, sottaciuto che i contenitori innovativi hanno sempre fatto rilevare livelli produttivi superiori a quelli ottenuti con i convenzionali contenitori alveolati e che il calo osservato con il trapianto delle piantine con il contenitore è risultato più evidente con la seconda epoca di trapianto rispetto alla prima in cui in particolare con i contenitori M60 r e M02 dette differenze non sono significative.

3.4 *Cavolo broccolo*

3.4.1 Introduzione

Il cavolo broccolo (*Brassica oleracea* L. var. *italica* Plenck) è una brassicacea di più recente introduzione nei comprensori orticoli italiani, dove insieme al cavolfiore interessa circa 22.000 ha di coltivazione per anno con una produ-

zione che raggiunge le 500.000 t. Il ricorso sempre più frequente a cultivar ibride di nuova generazione, la maggiore concentrazione di maturazione richiesta, la minore durata dei cicli colturali e la coltivazione su terreni non perfettamente idonei, hanno orientato i coltivatori verso la preparazione delle piantine in vivaio ed al successivo trapianto in campo. Annualmente si producono circa 723 milioni di piantine, principalmente in contenitore alveolato, ma da alcuni anni anche in contenitori singoli per coprire le superfici coltivate. L'impiego dei contenitori singoli di maggiore volume e quindi con maggiore substrato a disposizione di ciascuna piantina influenza direttamente la loro crescita (Monteleone et al., 2005; Trentini et al., 1996) e lo sviluppo con effetti positivi sulla produzione in termini di quantità, qualità e precocità (Alamprese, 2006). In questo contesto è maturata l'idea di studiare l'idoneità di alcuni contenitori innovativi a basso impatto ambientale per la preparazione in vivaio di piantine di cavolo broccolo e la successiva coltivazione in pieno campo valutandone il loro comportamento morfoprodotivo.

3.4.2. Preparazione delle piantine

La preparazione delle piantine è avvenuta in serra fredda presso il vivaio "Giustino Fortunato" di Lavello con le semine effettuate il 30 luglio 2005 per la prima epoca ed il 1° settembre per la seconda, collocando 2 semi in ciascuno dei seguenti contenitori: M60 r, M02-6,6, M60 100%, M00-6,6, M60 + M60/85, Contenitore alveolato da 90 e Contenitore alveolato da 228 alveoli, riempiti di terriccio universale. Sono stati usati i semi delle cv Marathon F1 (Sakata) e 'Ironman' (Royal-sluis) di simile precocità e differenti per la morfologia delle infiorescenze. Dopo l'emergenza è stato effettuato l'isolamento riducendo le piante a una per contenitore avendo cura di lasciare quella più verde e vigorosa. I trapianti sono avvenuti dopo 25 giorni dalle 2 semine con le piantine provviste di 3-4 foglie bene espanse ed alte 12-15 cm.

3.4.3 Trapianto e schema sperimentale

I trapianti in pien'aria sono stati effettuati su di un terreno arato, fresato, concimato e situato in area pianeggiante presso l'Azienda Agricola Sperimentale "Gaudio di Lavello" della Regione Basilicata. La superficie interessata dalla prova, rispettivamente per le 2 epoche di trapianto, dopo la squadratura e le

CONTENITORI	MODALITÀ DI TRAPIANTO (1)	TEMPO MEDIO DI RACCOLTA (gg)	PRODUZIONE COMMERCIABILE CORIMBI PRINC.		CARATTERISTICHE DEI CORIMBI										COMPATTEZZA (0-5) (4)
			CON FOGLIE (tha ⁻¹)	'TOLETTATI' (tha ⁻¹)	PESO MEDIO		SOSTANZA SECCA (%)	VIRESCENZA (0-5) (2)	GRANA (0-5) (3)						
					CON FOGLIE (g)	'TOLETTATI' (g)									
M 60 rete M02 Ø 6,6 M60 Ø 8 M00 Ø 6,6 M60+M60/85 Ø 8 Contentori alveolari	SV	76	16,8	14,3	498	434	14,0	15,6	39,2	0,9	9,2	0,1	0,9	0,6	
	V	77	16,6	13,8	517	440	13,5	15,6	39,1	9,5	8,5	0,1	1,1	0,5	
	SV	77	15,9	13,7	458	410	13,2	15,3	36,8	4,4	9,3	0,2	1,0	0,4	
	V	81	15,5	13,7	515	432	13,9	15,2	37,1	3,3	9,6	0,2	1,1	0,4	
	SV	76	17,3	15,3	496	429	14,4	15,8	37,5	2,4	9,2	0,0	1,2	1,0	
	V	80	15,4	13,2	499	406	13,9	15,2	37,5	15,4	8,0	0,1	1,2	0,7	
	SV	77	15,9	14,0	483	414	13,6	15,5	37,9	2,8	8,4	0,1	1,2	0,5	
	V	82	13,1	11,5	441	388	13,4	15,1	36,7	0,0	8,9	0,1	0,9	0,3	
	SV	76	17,2	14,8	505	427	13,7	15,1	36,1	3,3	8,9	0,1	1,1	0,7	
	V	81	15,3	13,1	483	414	13,5	15,0	38,0	13,2	8,6	0,1	0,9	0,5	
	90 fori	81	15,4	13,5	436	442	13,9	15,1	38,8	5,0	9,0	0,1	1,0	0,3	
	228 fori	85	13,6	11,5	470	407	14,0	15,0	37,5	19,3	8,5	0,4	1,1	0,1	
M 60 rete M02 Ø 6,6 M60 Ø 8 M00 Ø 6,6 M60+M60/85 Ø 8 Contentori alveolari	SV	80	15,6	12,2	466	377	13,6	16,1	36,8	66,3	8,1	0,0	1,1	1,8	
	V	80	15,0	12,1	464	388	14,3	15,9	36,1	77,5	7,9	0,0	1,0	1,7	
	SV	78	16,1	13,1	461	372	14,1	16,1	34,5	67,1	8,7	0,0	1,7	2,0	
	V	81	15,4	12,3	484	378	13,8	15,3	36,8	76,4	8,2	0,0	1,0	1,9	
	SV	78	16,4	13,2	481	374	13,7	15,7	36,3	55,6	8,7	0,1	1,2	1,8	
	V	81	14,2	11,3	468	373	13,9	15,2	36,2	63,6	8,0	0,0	1,0	1,5	
	SV	79	15,4	12,5	476	375	13,9	15,6	35,5	82,6	8,4	0,1	1,1	2,0	
	V	82	14,1	11,2	475	367	13,6	15,5	36,9	87,3	8,0	0,0	1,0	1,8	
	SV	79	15,9	12,9	478	378	14,3	16,0	35,7	81,5	8,3	0,1	1,1	2,1	
	V	81	14,5	11,6	466	374	13,8	15,1	35,4	73,1	8,6	0,1	0,9	1,8	
	90 fori	82	14,1	11,6	451	371	14,1	15,0	35,3	86,1	7,7	0,1	0,7	1,9	
	228 fori	85	12,1	9,7	447	356	14,0	14,9	35,4	64,8	8,1	0,1	1,0	1,6	

Tab. 22 *Influenza del tipo di contenitore e della modalità di trapianto delle piantine su alcune caratteristiche produttive e qualitative di due cultivar di cavolo broccolo (prima epoca di trapianto)*

(1) SV = senza vaso; V = con vaso; (2) Virescenza: 0 = assenza - 5 = massima presenza; (3) Grana: 0 = molto fine - 5 = molto grossa.

(4) Compattezza: 5 = scarsa compattezza - 0 = massima compattezza

CONTENITORI	MODALITÀ DI TRAPIANTO(1)	TEMPO MEDIO DI RACCOLTA (gg)	CORIMBI PRINCIPALI		CARATTERISTICHE DEI CORIMBI											
			(tha ⁻¹) CON FOGLIE	'TOLETTATI' (tha ⁻¹)	PESO MEDIO		DIAMETRO (cm)	LUNGHEZZA (cm)	SPESSORE (mm)	CUORE (%)	SOSTANZA (%)	VIRESCENZA (0-5) (2)	GRANA (0-5) (3)	COMPATTEZZA (0-5) (4)		
					(g) CON FOGLIE	(g) 'TOLETTATI'										
'Ironman'																
M 60 rete	SV	97,7	10,4	7,4	309	221	11,1	14,0	35,0	8,4	10,6	0,0	1,5	0,3		
	V	98,1	10,3	7,4	310	228	11,1	14,3	35,2	6,0	10,4	0,1	1,1	0,2		
M02 Ø 6,6	SV	94,3	11,2	8,0	335	237	10,9	14,1	35,1	4,7	10,5	0,1	1,1	0,4		
	V	99,0	10,4	6,7	288	207	10,8	14,4	35,4	5,6	10,3	0,1	1,4	0,4		
M60 Ø 8	SV	94,9	11,5	8,0	352	246	11,2	13,9	37,2	3,0	10,5	0,2	1,0	0,3		
	V	100,2	10,0	6,7	316	211	10,9	14,0	34,6	3,3	10,5	0,0	1,3	0,4		
M00 Ø 6,6	SV	94,8	11,3	7,8	338	243	10,9	13,8	35,1	4,2	10,3	0,1	1,1	0,3		
	V	100,1	10,0	6,6	319	212	10,4	14,0	34,7	3,1	11,1	0,1	1,3	0,3		
M60+M60/85 Ø 8	SV	93,6	11,4	8,2	348	244	11,3	13,6	37,1	6,0	10,1	0,2	1,2	0,3		
	V	98,9	9,8	6,7	313	214	10,4	13,9	35,2	5,6	11,0	0,1	1,4	0,1		
Contentitori alveolati	90 fori	101,7	10,3	6,7	311	203	10,7	13,4	34,4	2,6	10,4	0,1	1,6	0,3		
	228 fori	109,3	8,1	4,5	241	133	9,6	13,2	31,4	1,6	11,4	0,1	1,0	0,4		
'Marathon'																
M 60 rete	SV	98,3	11,7	7,2	354	218	11,5	14,0	35,7	3,1	8,0	0,0	0,9	1,2		
	V	98,7	11,2	7,3	344	222	10,9	13,9	35,1	9,7	8,0	0,1	0,6	1,2		
M02 Ø 6,6	SV	95,6	12,9	7,8	365	232	10,8	13,9	34,9	20,7	8,8	0,1	0,8	1,2		
	V	99,0	10,8	6,9	334	219	10,9	13,8	35,4	6,7	8,7	0,1	0,8	1,4		
M60 Ø 8	SV	93,7	12,5	7,9	374	253	11,4	14,5	36,1	14,0	8,5	0,1	0,9	1,0		
	V	98,6	11,5	7,4	346	220	10,7	13,7	34,6	12,4	7,2	0,1	0,7	1,2		
M00 Ø 6,6	SV	95,4	12,1	7,1	360	223	11,2	13,8	36,2	20,7	8,7	0,2	0,6	1,1		
	V	100,8	11,2	7,1	334	211	11,5	13,9	34,5	6,1	8,4	0,1	0,5	1,3		
M60+M60/85 Ø 8	SV	94,4	11,8	7,6	357	231	11,5	14,2	36,2	17,2	7,1	0,1	1,0	1,1		
	V	98,8	10,9	7,1	343	227	10,8	14,2	36,4	12,7	8,6	0,1	0,7	1,2		
Contentitori alveolati	90 fori	102,5	10,0	6,2	308	192	10,8	13,8	33,9	5,7	9,7	0,0	0,7	1,2		
	228 fori	106,8	7,3	4,3	253	159	9,9	13,2	31,8	2,6	9,6	0,1	1,2	1,3		

Tab. 23. *Influenza del tipo di contenitore e della modalità di trapianto delle piantine su alcune caratteristiche produttive e qualitative di due cultivar di cavolo broccolo (seconda epoca di trapianto)*

(1) SV = senza vaso; V = con vaso; (2) Virescenza: 0 = assenza - 5 = massima presenza.; (3) Grana: 0 = molto fine - 5 = molto grossa; (4) Compattezza: 0 = massima - 5 = scarsa.

operazioni di posa dei cartellini, è stata assolata con solchi 10 cm profondi disposti in file binate a 40 cm distanti e con le piante collocate a 30 cm tra loro con la distanza tra l'interasse delle bine di 170 cm. Contemporaneamente veniva predisposto l'impianto irriguo costituito da manichette con gocciolatori con la capacità di erogare 2 lh^{-1} di acqua. In corrispondenza del trapianto ed a fine ciclo sono state osservate le condizioni dei contenitori i cui risultati sono riportati in tabella 24.

Il piano sperimentale ha previsto la realizzazione dello schema sperimentale a parcelle suddivise ripetuto 3 volte, con la collocazione delle 2 epoche di trapianto nelle parcelle, le cultivar nelle sub-parcelle, il tipo di contenitore nelle sub-sub-parcelle e la modalità di trapianto nelle parcelline di 10 m^2 , per un totale di 48 trattamenti sperimentali. Le raccolte hanno avuto inizio il 2/11/2005 per un totale di 5 passaggi successivi nella prima epoca, e sono iniziate in 19/12/2005 e sono continuate sino al 23/01/2006 per un totale di 6 raccolte nella seconda epoca.

3.4.4 Risultati produttivi

3.4.4.1 1^a Epoca di trapianto

La tabella 22 riassume i risultati produttivi della prima epoca di trapianto, da cui si evince che i livelli produttivi raggiunti sono stati di $15,7$ e $13,5 \text{ tha}^{-1}$ di corimbi commerciabili con foglie e toelettati in 'Ironman' e $14,9$ e 12 tha^{-1} in 'Marathon' rispettivamente. In particolare facendo riferimento ai corimbi affogliati della 'Ironman', questi sono passati da $16,6 \text{ tha}^{-1}$ quando le piante sono state trapiantate senza contenitore a $15,2 \text{ tha}^{-1}$ con contenitore, rispetto alle $15,4 \text{ tha}^{-1}$ e $13,6 \text{ tha}^{-1}$ dei contenitori con 90 e 228 alveoli, in quest'ultimo caso perdendo anche in termini di precocità. La produzione non ha subito variazioni di rilievo con i contenitori M 60 rete e M02 6,6 con la loro presenza od assenza dopo il trapianto, a differenza degli altri contenitori che quando hanno accompagnato le piantine in campo hanno fatto osservare una flessione produttiva più evidente con M00 6,6. La 'Marathon' ha fatto osservare in media $15,9 \text{ tha}^{-1}$ e $14,6 \text{ tha}^{-1}$ di corimbi commerciali affogliati, rispettivamente quando il contenitore non ha accompagnato le piantine dopo il trapianto e quando detta operazione è avvenuta con le piantine invasate, mentre i contenitori da 90 facevano osservare $14,1 \text{ tha}^{-1}$ e quelli da 228 alveoli $12,1 \text{ tha}^{-1}$ di infiorescenze della stessa tipologia. La presenza del contenitore dopo il trapianto ha sortito effetti poco significativi pur confermando la

CONTENITORI	INDICE DI DEGRADAZIONE (1)			
	1 ^A EPOCA		2 ^A EPOCA	
	TRAPIANTO FINE CICLO		TRAPIANTO FINE CICLO	
M 60 rete	1,5	3,0	1,4	3,5
M02 Ø 6,6 cm	2,5	4,8	2,0	4,9
M60+M60/85 Ø 8 cm	0,1	0,4	0,2	0,3
M00 Ø 6,6 cm	0,0	0,3	0,1	0,4
M60 Ø 8 cm	0,0	0,5	0,1	0,4

Tab. 24 *Indice di degradazione dei contenitori al trapianto ed a fine ciclo colturale (dati medi delle due cultivar)*

1) 0 = Materiale non degradato; 5 = completamente degradato.

tendenza ad influenzare negativamente i livelli produttivi. Gli altri caratteri dei corimbi studiati sono variati entro limiti accettabili ad eccezione della loro pezzatura che è risultata più contenuta con l'impiego dei contenitori alveolati.

3.4.4.2 2^a Epoca di trapianto

In media le 2 cultivar hanno esitato una produzione commerciabile di corimbi con foglie di 10,8 tha^{-1} , circa 4,5 tha^{-1} in meno rispetto alla prima epoca. I livelli produttivi hanno raggiunto 10,4 e 7,1 tha^{-1} di corimbi commerciabili con foglie e toelettati in 'Ironman' e 11,2 e 7 tha^{-1} in 'Marathon'. I corimbi affogliati della 'Ironman' sono passati da 11,2 tha^{-1} quando le piante sono state trapiantate senza contenitore a 10,1 tha^{-1} con contenitore, rispetto alle 10,3 tha^{-1} e 8,1 tha^{-1} dei contenitori da 90 e 228 alveoli, perdendo anche in termini di precocità. La presenza del contenitore dopo il trapianto ha tendenzialmente ridotto le produzioni entro limiti non significativi. La 'Marathon' ha fatto osservare in media 12,2 tha^{-1} e 11,1 tha^{-1} di corimbi commerciali affogliati, rispettivamente quando il contenitore non ha accompagnato le piantine dopo il trapianto e quando detta operazione è avvenuta con le piantine invasate, mentre i contenitori da 90 facevano osservare 10 tha^{-1} e quelli da 228 alveoli 7,3 tha^{-1} di infiorescenze della stessa tipologia, ma raccolte con alcuni giorni di ritardo. La presenza del contenitore dopo il trapianto ha fatto osservare un calo produttivo al limite della significatività in tutte le tesi. Le piantine allevate nei contenitori alveolati hanno depresso le produzioni specialmente quelle ottenute nei contenitori a più elevato numero di alveoli con effetti sulla pezzatura dei corimbi che sono risultati di minore peso medio, e come detto, sono risultati anche meno precoci.

3.4.5 Degradazione dei contenitori

I contenitori M60r e M02, aventi chiari sintomi di degradazione al momento del trapianto, si presentavano abbastanza decomposti a fine ciclo rispetto alle altre tipologie che in corrispondenza dell'ultima raccolta mostravano segni minimi di degradazione. In definitiva si può ritenere che i contenitori innovativi studiati hanno favorito chiaramente la produttività del cavolo broccolo rispetto ai contenitori alveolati, senza differenza tra le modalità di trapianto per i contenitori M60r e M02, e con una lieve flessione produttiva con quelli meno degradabili (M60, M00 e M60 + M60/85) quando hanno accompagnato le piantine al trapianto.

3.4.6 Conclusioni

L'epoca di trapianto ha influenzato le caratteristiche produttive, infatti i corimbi affogliati e quelli toelettati sono diminuiti del 31,3% e del 46,2% passando dal primo al secondo trapianto a causa della riduzione della pezzatura delle infiorescenze.

Le cultivar Ironman e 'Marathon' mostrano livelli produttivi molto simili per avere infiorescenze sia con foglie che toelettate di medesimo peso medio.

I contenitori innovativi in generale hanno potenziato la produttività del cavolo broccolo facendo osservare produzioni sempre più elevate rispetto ai contenitori alveolati normalmente impiegati per la produzione delle piantine di questa specie.

Le modalità di trapianto, con o senza il contenitore, indicano che il cavolo broccolo essendo dotato di un robusto apparato radicale riesce a superare la barriera che il contenitore frappone tra esso e l'ambiente podologico circostante con effetti minimi sulla crescita, sviluppo e produttività. In particolare, i contenitori M60r e M02 risultano ottimali, in quanto il loro impiego non ha causato flessioni produttive quando hanno accompagnato le piantine al trapianto, anzi in qualche caso ne hanno potenziato la produttività. Gli altri contenitori (M60, M00 e M60 + M60/85), meno degradabili, evidenziano effetti depressivi con cali produttivi, in media, del 4-6%, al limite della significatività, ma che sarebbe opportuno non si verificassero. L'ulteriore verifica dei contenitori M60r e M02 per la conferma dei risultati positivi ottenuti e l'apporto di modifiche al processo tecnologico degli altri (M60, M00 e M60 + M60/85) in termini di composizione delle mescole di partenza, può essere

utile per migliorare le loro caratteristiche di durata e di degradabilità in sintonia con le esigenze dell'apparato radicale di questa specie orticola.

3.5 *Pomodoro*

3.5.1 Introduzione

Il pomodoro (*Lycopersicon esculentum* Mill.) è una solanacea che in Italia interessa circa 122.350 ha di coltivazione per anno, distinti in 114.390 ha come pomodoro da industria e circa 7.960 ha di pomodoro da mensa. Per una serie di circostanze, in entrambi i casi, si fa ricorso quasi sempre alla preparazione delle piantine ed al successivo trapianto con l'onere di demandare al vivaista la preparazione delle piantine. Attualmente ciò avviene facendo ricorso a contenitori alveolati in polistirolo da 80-90 alveoli per le piantine di pomodoro da mensa e a contenitori da 110 sino a 170 alveoli per quelle da industria. Limitato è l'impiego di contenitori singoli, riservati al settore hobbistico ed amatoriale e risultano fatti in PP o altro materiale sintetico. In base alle superfici su esposte, si calcola che sono necessari circa 5 miliardi e 958 milioni di piantine per anno per questa specie. L'esigenza di avere contenitori a basso impatto ambientale, degradabili e compatibili col metodo biologico è molto sentito dai coltivatori del pomodoro di qualità e biologico.

3.5.2 Obiettivi

Con la presente linea di ricerca si è inteso: 1) studiare l'idoneità di alcuni contenitori innovativi per l'allevamento di piantine di pomodoro; 2) valutare i parametri morfologici delle piantine di pomodoro durante l'allevamento in vivaio; 3) valutare in termini quali-quantitativi la produzione di bacche alla raccolta; 4) verificare la possibilità di effettuare il trapianto delle piantine interrando anche i contenitori; 5) verificare lo stato dei contenitori (degradazione) al momento del trapianto e a fine ciclo colturale.

3.5.3 Preparazione delle piantine

La preparazione delle piantine di pomodoro della cv Granate ha avuto luogo presso i vivai Altamura di Montecorvino Pugliano (SA) con la semina ef-

CONTENITORI	CARATTERISTICHE					
	MATERIALE	FORMA	DIAMETRO		ALTEZZA	VOLUME
			SUPERIORE	INFERIORE	(cm)	(cm³)
			(cm)	(cm)		
“M60 rete”	Poliestere biodegradabile	Troncoconica	5,5	4,0	4,0	90
“M02”	Poliestere biodegradabile caricato con fibra vegetale	“	6,6	5,0	7,0	180
“M00”	Poliestere biodegradabile	“	6,6	5,0	7,0	180
“M60/50”	Poliestere biodegradabile	“	8,0	5,5	5,5	200
“Contentitore alveolato”	Polistirolo	“ ⁽¹⁾	5,0	5,0	5,7	85
“Torba pressata”	Torba	“	3,5	3,5	5,0	100

Tab. 25 *Tipologie di contenitori impiegati nella preparazione delle piantine di pomodoro in vivaio*

(1) Si riferisce alla forma del singolo alveolo

fettuata il 07/02/06 in 4 contenitori innovativi biodegradabili differenti per dimensioni e composizione dei materiali impiegati, a cui sono stati aggiunti, quali termini di confronto, un contenitore alveolato in polistirolo da 40 alveoli e dei contenitori in torba pressata (tab. 25).

Per ciascuna tipologia di contenitore sono state preparate 360 piantine suddivise in 3 gruppi da 120 corrispondenti alle ripetizioni. Le 6 tesi a confronto (4 contenitori innovativi + 1 contenitore alveolato + 1 contenitore in torba), sono state distribuite in serra seguendo lo schema sperimentale a blocchi randomizzati con 3 ripetizioni.

3.5.4 Trapianto e schema sperimentale

Il trapianto è stato effettuato il 24 marzo 2006 in una serra fredda in metallo e plastica (LDPE 200 µm) avente una cubatura di 2,8 m³/m⁻², situata in area pianeggiante a circa 5 m slm, presso l'Azienda “Fortunato” di Battipaglia, su di un terreno caratterizzato da una tessitura a grana media (51,3 % limo, 29,0 % sabbia e 19,7% argilla), una reazione leggermente alcalina (pH 7,68), un basso contenuto in azoto totale (0,8 g/kg,) ed un contenuto in sostanza organica pari a 9,2 g/kg; inoltre, ri-

sultava ben dotato in fosforo (21,2 mg/kg) e potassio scambiabile (215 mg/kg).

Al momento del trapianto campioni di 10 piantine per tesi e ripetizione sono state sottoposte a prelievi distruttivi ed analizzate per i seguenti caratteri biometrici: altezza, diametro dello stelo, numero di foglie vere, peso fresco e contenuto in sostanza secca (%) della parte epigea, superficie fogliare, peso secco delle radici, mentre si effettuavano rilievi visivi sullo stato dei contenitori mediante l'assegnazione di un punteggio di valori crescenti da 0 (contenitore completamente intatto) a 5 (contenitore completamente degradato).

Per ogni tipo di contenitore innovativo e per quelli in torba, sono state realizzate due modalità di posa a dimora delle piantine: con e senza il contenitore; sono state così realizzate 11 tesi sperimentali (5 contenitori x 2 modalità di trapianto + 1 contenitore alveolato) collocate in serra secondo lo schema a blocchi randomizzati con 3 repliche. Le parcelle elementari costituite da 8 piante avevano una lunghezza di 3,2 m. Il sesto d'impianto è stato quello a file binate con un interasse di 150 cm, con le piantine collocate ogni 40 cm sulle file distanti 50 cm tra loro in modo da realizzare una densità di 2,4 piante/m².

3.5.5 Conduzione della prova

Durante il ciclo colturale sono state effettuate ripetute adeguate con cadenza settimanale, sfemminellature e tutoraggio, e sono stati apportati, in più riprese, 250 kg ha⁻¹ di N, 100 kg ha⁻¹ di P₂O₅ e 350 kg ha⁻¹ di K₂O in fertirrigazione a partire dall'attecchimento avendo cura di mantenere la conducibilità della soluzione nutritiva somministrata entro i limiti di 1,5 mS/cm - 2,4 mS/cm. La cimatura è stata eseguita al di sopra dell'8° palco florale con le piante alte, in media, 180 cm.

Le raccolte delle bacche sono state effettuate con 11 passaggi scalari a partire dal 4 giugno (4-10-17-22 e 26 giugno, e l'1-5-11-16-19 e 30 luglio) al 30 luglio 2006 asportando tutti i frutti maturi di ogni parcella. Successivamente, le bacche sono state classificate in commerciabili e di scarto e pesate, inoltre, in laboratorio, su campioni di 5 frutti commerciabili per parcella sono stati rilevati i seguenti caratteri qualitativi: peso medio, lunghezza e diametro, solidi solubili (°Brix) e sostanza secca (%). I dati rilevati sono stati sottoposti ad analisi della varianza (ANOVA) separando i valori medi risultati statisticamente differenti con il test della minima differenza significativa (MDS) considerando un livello di $P \leq 0,05$.

CONTENITORI (1)	PIANTA		STELO		FOGLIE		PARTE AEREA		RADICI	PIANTA
	IPOCOTILE (mm)	ALTEZZA (cm)	LUNGHEZZA (cm)	SPESORE (mm)	(n.)	SUPERFICIE (cm ²)	PESO SECCO (mg)	SOSTANZA SECCA (%)	PESO SECCO (mg)	PESO SECCO (mg)
"M60r"	37,5	21,9	6,0	2,6	3,5	33,5	131	8,3	21,9	153
"M02"	50,0	18,0	7,0	2,4	3,5	30,0	112	7,9	18,0	130
"M00"	48,0	14,5	6,5	2,8	3,5	31,0	111	7,5	14,5	126
"M60/50"	51,0	13,9	7,8	2,8	3,3	34,5	109	7,5	13,9	123
Alveolato	51,0	11,4	7,5	2,8	3,8	26,0	122	7,5	11,4	133
"Torba"	37,5	12,9	5,3	2,2	3,0	18,7	58	7,3	12,9	71
MDS 0,05P	6,8	2,8	0,8	0,4	0,3	8,0	17,8	n.s.	2,8	18,7

Tab. 26 *Parametri biometrici delle piantine di pomodoro da mensa in relazione al tipo di contenitore impiegato*

(1) n.s. = Differenze statisticamente non significative.

3.5.6 Risultati

3.5.6.1 Parametri biometrici delle piantine

Come si può osservare in tabella 26 la crescita in vivaio delle piantine di pomodoro è stata, in generale, poco influenzata dal tipo di contenitore impiegato. In particolare, i contenitori in torba pressata hanno fatto registrare valori significativamente inferiori del peso secco della parte aerea e totale (parte aerea + radici) rispetto a tutti gli altri. Il contenitore alveolato ha mostrato un comportamento quasi simile a tutti i vasi innovativi. Le differenze tra questi ultimi sono state poco evidenti e quasi sempre al limite della significatività; da segnalare, comunque il migliore sviluppo radicale osservato con l'impiego del contenitore M60r.

3.5.6.2 Risposta produttiva della coltura

Dalla tabella 27 si può osservare che i parametri produttivi e qualitativi delle bacche di pomodoro non sono stati influenzati dal tipo di contenitore impiegato per l'allevamento in vivaio delle piantine, specialmente se si considerano quelli in materiali biodegradabili ed in torba. In particolare, sono risultate leggermente più produttive le piantine pre-coltivate nel contenitore alveolato (142 tha⁻¹ rispetto ad un valore medio di 126 tha⁻¹ delle altre tesi). La modalità di trapianto (con vaso e senza), inoltre, non ha

CONTENITORI (2)	MODALITÀ DI TRAPIANTO (1)	BACCHE COMMERCIALI PER PIANTA		QUALITÀ BACCHE					TEMPO MEDIO DI RACCOLTA (gg)
		(N.)	(t ha ⁻¹)	PESO MEDIO (g)	DIAMETRO (cm)	LUNGHEZZA (cm)	SOLIDI SOLUBILI (°Brix)	SOSTANZA SECCA (%)	
"M60r"	SV	42,2	128	108	4,9	7,4	4,4	4,8	113
"	V	42,7	130	108	4,8	7,4	4,5	5,0	113
"M02"	SV	40,9	121	107	4,8	7,3	4,5	5,2	113
"	V	44,6	133	106	4,9	7,3	4,5	5,1	113
"M00"	SV	42,1	125	102	4,8	7,3	4,6	4,7	113
"	V	38,3	119	108	4,9	7,5	4,6	5,1	113
"M60/50"	SV	41,0	119	106	4,9	7,3	4,6	5,5	113
"	V	39,1	120	109	4,8	7,4	4,4	5,3	113
Alveolato "	-	47,3	142	113	4,9	7,6	4,5	4,6	111
"Torba"	SV	43,6	132	105	4,9	7,4	4,5	5,1	112
"	V	41,6	128	107	4,9	7,5	4,6	4,9	112
MDS 0,05P	-	6,9	17,5	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.	n.s.

Tab. 27 *Influenza del tipo di contenitore e della modalità di trapianto sulla produzione e qualità del pomodoro*

(1) SV = trapianto senza vaso; V = trapianto con vaso.

(2) n.s. = Differenze statisticamente non significative.

influenzato la produttività e la precocità della coltura anche quando sono stati impiegati i contenitori in torba. Il prosieguo della ricerca con ulteriori approfondimenti è estremamente necessario specialmente per i contenitori M00 e M60/50 che, anche se in modo non significativo, hanno depresso lievemente i livelli produttivi quando hanno accompagnato le piantine con il trapianto. I vasetti di torba hanno confermato la loro validità, ma rispetto ai contenitori alveolati risultano meno efficaci e necessitano di ulteriori verifiche per avere lumi sull'interazione torba piantina ai fini della loro crescita e sviluppo.

3.5.7 Degradazione dei contenitori

Come si può osservare in tabella 28, al momento del trapianto, soltanto il vaso "M02", mostrava chiari segni di degradabilità specialmente sulle pareti

CONTENITORI	INDICE DI DEGRADAZIONE ⁽¹⁾	
	AL TRAPIANTO	A FINE CICLO COLTURALE
"M60r"	0,9	4,0
"M02"	1,2	5,0
"M00"	0,2	1,2
"M60/50"	0,1	1,1
Alveolato	-	-
"Torba"	0,2	3,0

Tab. 28 *Indice di degradazione dei contenitori al trapianto ed a fine ciclo colturale*

(1) 0 = materiale integro; 5 = materiale completamente degradato.

lateralmente. Tutti gli altri contenitori si presentavano quasi integri con lievi incrinature appena apprezzabili ad occhio nudo.

L'innescò del processo di degradazione è risultato ben più evidente a fine ciclo di coltivazione sui vasi lasciati a dimora insieme alle piantine. In particolare, il contenitore "M02" si era degradato del tutto ed erano presenti soltanto piccoli frammenti di materiale. L'M60/50 e l'M00, al contrario, si presentavano abbastanza integri anche se le lesioni erano ben evidenti. Il contenitore a rete "M60r", infine, presentava segni di degradazione di livello intermedio.

3.5.8 Conclusioni

I contenitori innovativi studiati hanno fatto osservare tutti risultati comparabili tra loro e del tutto paragonabili a quelli ottenuti con i vasetti di torba e i contenitori alveolati termini di confronto. Particolarmente interessanti sembrano i contenitori M60r e gli M02 per la loro elevata degradabilità e per non aver creato ostacolo al normale accrescimento delle radici quando hanno accompagnato le piante di pomodoro dopo il trapianto. Negli altri casi il prosieguo delle osservazioni è necessario per fugare i dubbi che ancora persistono.

3.6 Pomodoro "cherry"

3.6.1 Introduzione

Il pomodoro tipo "cherry" è in continua espansione nei comprensori orticoli meridionali e costituisce un prodotto di nicchia di qualità per molti consumatori che ne fanno ampio consumo. Si impiegano semi ibridi, molto spesso costosi e di non agevole reperimento, che inducono pertanto la preparazione

delle piantine in vivaio. Con questa linea di ricerca si è voluto studiare il comportamento di alcuni contenitori innovativi impiegati per la produzione di piantine di pomodoro “cherry” da trapiantare in pieno campo e la loro influenza sulla produttività e qualità delle bacche alla raccolta.

3.6.2 Preparazione delle piantine

La preparazione delle piantine è avvenuta in serra fredda presso il vivaio orticolo della Cooperativa “Giustino Fortunato” di Gaudiano di Lavello, con la semina effettuata il 12 maggio 2006 in 4 contenitori di 9 cm di diametro di cui 3 biodegradabili: “M12”, “M60/TG/5” e “M60/TG/20”, a base di amido termoplastico il primo e con l’aggiunta del 5 e del 20 % di compost il secondo e terzo, ed uno convenzionale a base di polipropilene (PP). In ogni vasetto sono stati collocati 2 semi della linea ad accrescimento determinato di pomodoro “cherry” ‘PX 02325715 F₁’ (Seminis Italia) allestendo complessivamente 750 contenitori per ogni tipologia di materiale pari a 250 unità per ripetizione. Dopo l’emergenza è stato effettuato il diradamento lasciando una piantina per vasetto. Dopo circa un mese le piantine erano pronte per il trapianto; prima della messa a dimora in pieno campo su campioni di 10 piantine per tesi e ripetizione sono stati effettuati i seguenti rilievi biometrici: lunghezza dell’ipocotile e dell’epicotile, altezza e spessore dello stelo, peso fresco e peso secco degli organi epigei, peso secco delle radici, superficie fogliare, peso fresco e secco dell’intera piantina (tab. 29).

3.6.3 Trapianto e schema sperimentale

Il trapianto delle piantine è stato effettuato in pieno campo, presso l’Azienda Agricola Sperimentale “Gaudiano” in agro di Lavello (PZ), il 13 giugno 2006 su di un terreno arato, fresato e livellato, collocando le piantine ogni 30 cm su file distanti 170 cm tra loro in modo da ottenere una densità di 1,96 piante/m². In corrispondenza del trapianto, alle osservazioni effettuate in vivaio sui contenitori e sulle piantine durante la fase di crescita, si sono aggiunti i rilievi sullo stato dei contenitori e sulle piantine. Inoltre, è stato stabilito di studiare 2 modalità di trapianto: con e senza interrimento del contenitore, realizzando lo schema sperimentale a parcelle suddivise ripetuto 3 volte, con la collocazione dei 4 contenitori nelle parcelle, e le due modalità di trapianto nelle sub-parcelle di 8,5 m² per un totale di 8 tesi sperimentali.

CONTENITORI ⁽¹⁾	LUNGHEZZA		PIANTA	FUSTO	FOGLIE		PARTE AEREA		RADICI	PIANTE
	IPOCOTILE (mm)	EPICOTILE (mm)	ALTEZZA (cm)	SPESORE (mm)	(n.)	SUPERFICIE (cm ²)	PESO SECCO (g)	SOSTANZA SECCA (%)	PESO SECCO (mg)	PESO SECCO (mg)
"M12"	22,5	105,0	14,5	5,0	5,0	154	900	8,4	269	1169
"M60/TG/5"	27,5	82,5	11,5	4,0	4,5	118	685	8,6	177	861
"M60/TG/20"	20,0	82,5	12,0	4,5	4,5	113	619	8,0	176	795
"PP"	17,5	87,5	12,5	4,0	5,0	120	657	8,3	159	817
MDS 0,05 P	4,1	5,8	0,8	0,5	n.s.	13	148	0,2	39	184

Tab. 29 *Parametri biometrici delle piantine di pomodoro "cherry" in relazione al tipo di contenitore*

(1) n.s. = Differenze statisticamente non significative.

3.6.4 Conduzione della prova

Il ciclo colturale in campo ha seguito la tecnica colturale normalmente adottata per il pomodoro "cherry" nel comprensorio, e si è concluso il 07/09/2006 con la raccolta 'a grappolo' delle bacche in corrispondenza della quale è stata valutata la produzione commerciabile (numero e peso dei grappoli e delle bacche per pianta e per parcella) ed alcuni parametri di qualità delle bacche (peso medio, diametro, contenuto in sostanza secca e solidi solubili). Inoltre, è stato calcolato il peso secco della parte epigea (bacche, steli e foglie) ed ipogea (radici) delle piante di ogni parcella. Tutti i dati collezionati sono stati sottoposti all'analisi della varianza (ANOVA) separando i valori medi, risultati statisticamente differenti, con il test della minima differenza significativa (MDS) considerando il livello di $P \leq 0,05$.

3.6.5 Risultati

3.6.5.1 Parametri biometrici delle piantine

Come si può osservare in tabella 29, l'impiego dei diversi contenitori ha sortito effetti significativi sullo sviluppo delle piantine di pomodoro in vivaio. In particolare, il contenitore "M12" è risultato superiore a tutti gli altri in quanto ha favorito

CONTENITORI ⁽¹⁾	MODALITÀ DI TRAPIANTO ⁽²⁾	GRAPPOLI COMMERCIALIBILI		P I A N T E			QUALITÀ BACCHE		
				FIORITURA	BIOMASSA FRESCA A FINE CICLO				
		PER PIANTA (n.)	(t ha ⁻¹)		STELI E FOGLIE (t ha ⁻¹)	STELI, FOGLIE E RADICI (t ha ⁻¹)	DIAMETRO (mm)	SOLIDI SOLUBILI (°Brix)	SOSTANZA SECCA (%)
“M12”	V	39,3	37,6	45,0	15,2	17,5	24,8	8,2	10,8
“	SV	50,7	48,5	57,7	17,0	19,2	25,7	8,4	10,8
“M60/TG/5”	V	35,0	33,5	48,3	17,5	20,3	24,4	8,8	11,4
“	SV	37,6	36,0	62,3	19,6	22,3	24,4	8,5	11,4
“M60/ TG/20”	V	36,6	35,0	50,0	25,3	27,6	24,8	8,5	11,0
“	SV	39,4	37,7	62,0	27,4	30,7	24,3	8,9	11,1
“PP”	V	33,7	32,2	43,0	16,5	18,9	24,9	8,4	10,7
“	SV	42,0	40,2	56,0	17,0	18,9	26,0	8,6	10,9
MDS 0,05 P	-	2,7	2,6	5,8	1,3	1,5	n.s.	n.s.	n.s.

Tab. 30 *Parametri produttivi del pomodoro “cherry” in relazione al contenitore impiegato in vivaio e alla modalità di trapianto adottata in pieno campo*

(1) n.s. = differenze statisticamente non significative.

(2) V = con contenitore; SV = senza contenitore.

significativamente l'accumulo di sostanza secca sia negli organi ipogei che epigei delle piantine e ne ha anche migliorato i parametri morfologici (diametro dello stelo e superficie fogliare). Gli altri due contenitori biodegradabili hanno manifestato un comportamento quasi simile al testimone (PP) e si sono distinti da quest'ultimo soltanto per il maggior contenuto (%) in sostanza secca della parte epigea.

3.6.5.2 Risposta produttiva della coltura

I parametri produttivi sono stati significativamente influenzati sia dal tipo di contenitore impiegato per l'allevamento delle piantine in vivaio sia dalla modalità di trapianto (con e senza vaso). Al contrario, la qualità delle bacche non ha subito alcuna variazione. I grappoli commerciabili per pianta e la produzione areica (tha⁻¹) sono risultati più elevati (50,7/pianta e 48,5 t ha⁻¹, rispettivamente) con l'impiego delle piantine allevate nel contenitore “M12” trapiantate senza il vaso. Le stesse piantine hanno accusato una flessione produttiva di oltre 11 grappoli per pianta

e 10 tha^{-1} quando sono state messe a dimora con il contenitore. I contenitori biodegradabili contenenti il 5 e 20 % di compost ("M60/TG/5" e "M60/TG/20") non hanno fatto registrare differenze significative con le due modalità di trapianto; inoltre, quando sono stati interrati con la piantina, queste sono risultate più produttive rispetto alle piante del testimone (PP). Infine, il contenitore a maggior contenuto di compost ("M60/TG/20") ha fatto registrare livelli di biomassa epigea e radicale superiore a tutti gli altri contenitori con entrambe le modalità di trapianto; tuttavia tale superiorità non ha avuto riflessi significativi sulla produzione delle bacche. Da notare il significativo calo produttivo delle piante trapiantate con il contenitore M12 ($- 10,9 \text{ tha}^{-1}$) e PP ($- 8 \text{ tha}^{-1}$).

3.6.6 Degradazione dei contenitori innovativi

Al trapianto nessuno dei contenitori mostrava segni evidenti di cedimento sulle sue pareti. A fine ciclo sui vasi lasciati a dimora insieme alle piantine di pomodoro la degradazione è risultata ben evidente e leggermente superiore per il contenitore contenente una maggiore percentuale di compost ("M60/TG/20") in cui le lesioni erano più incise e di maggiore dimensioni. Meno chiari erano in M60/TG/5 e M12, e assenti in quelli in PP.

3.6.7 Conclusioni

I risultati conseguiti indicano l'idoneità dei contenitori saggiati per la produzione di piantine di pomodoro tipo "cherry". Le migliori piantine da trapiantare sono state ottenute con il contenitore "M12", mentre la migliore performance è stata fornita dal contenitore "M60/TG/20" quando ha accompagnato le piantine dopo il trapianto, ciò probabilmente è da mettere in relazione al suo maggiore contenuto di compost che ne ha accelerato la degradazione e facilitato l'espandersi degli apparati radicali nel terreno. Un ulteriore approfondimento è necessario per gli altri contenitori, prima di consigliarne l'impiego, specialmente per quelli che quando hanno accompagnato le piantine con il trapianto hanno ridotto i livelli produttivi.

RIASSUNTO

La preparazione delle piantine in vivaio costituisce un segmento molto importante della filiera ortofloricola per le numerose specie interessate. Il trapianto di plantule con 'pane di

terra' in contenitore è una realtà da cui non si può prescindere per gli indubbi vantaggi che ne derivano, pertanto, la formulazione di contenitori di nuova generazione per le operazioni di pre-coltura è un aspetto tecnico in via di soluzione. Il contenitore 'ideale' deve presentare caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, gestionali e di impatto ambientale ottimali in relazione con la specie di cui si devono preparare le piantine. In campo orticolo, dove molto spesso, si richiede la preparazione di elevati numeri di piantine, i contenitori devono essere di agevole gestione, piccoli, degradabili, di facile decomposizione quando interrati con le piantine al trapianto e/o essere compostabili dopo il loro impiego. Il Progetto di Ricerca: SCIMAB ha affrontato alcune di queste problematiche con la messa a punto di alcuni prototipi di contenitori biodegradabili innovativi, saggiati per la pre-coltura di piantine di carciofo, asparago, cavolo broccolo, melone e pomodoro, e le stesse valutate in cicli colturali per qualità e produttività. In questa nota si riportano i primi risultati conseguiti.

ABSTRACT

Pre plant growing is one of the most important step in vegetable crops and floriculture species in which seedling are request. Transplanting with protect root (bare root) system seedling is welcome and innovative new pot-containers made by biodegradable material is in the way to be solved. The 'ideal' pot-container for seedling preparation must have physic, chemic, microbiology, handling and environmental impact traits at highest level as possible in relation to the seedling species preparation. In vegetable crops seedling cultivation, in which frequently, it need high number of plantlets preparation, pot-containers will be easy handling, small, biodegradable, easy decomposition in the soil and/or compost able at the end of the using process. The SCIMAB Project has been involved in solving some of the above problems, starting with new innovative pot-containers made by biodegradable material and used to make artichoke, asparagus, broccoli, melon and tomato seedlings that were also tested for quality and quantity traits in growing cycles compared with the conventional pot-containers. This paper reports the first result carried out.

BIBLIOGRAFIA

- CANDIDO V., ALAMPRESE L., VERDEROSA G., LACARPIA F., GHERBIN P., MICCOLIS V. (2007): *Aspetti morfologici e produttivi del cavolo broccolo in relazione alle modalità di preparazione delle piantine*, «Italus Hortus», 14 (2), pp.173-174.
- CANDIDO V., CASTRONUOVO D., MANERA C., MICCOLIS V. (2008): *Poinsettia* (Euphorbia pulcherrima) *cultivation in biodegradable pots: mechanical and agronomical behaviour of pots and plant traits*, «Acta Horticulturae», 801, pp. 1563-1570.
- MICCOLIS V., DI MATTEO M. (2005): *Per una ortofloricoltura ecocompatibile*, «Colture Protette», 11, pp. 67-68.
- MICCOLIS V., LANDI M., FORTUNATO A., CIMINELLI D., CASTRONUOVO D. (2007): *Impiego di contenitori innovativi per la preparazione di piantine di cocomero*, «Italus Hortus», 14 (2), p. 183.
- MONTELEONE M., GATTA G., FRABONI L., DE CARO A. (2005): *Produzione in vivaio di*

piantine di cavolo broccolo (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) allevate in contenitori alveolari di diverso tipo, Atti 7^e Giornate Scientifiche S.O.I. Napoli, 4-6 maggio 2004, pp. 937-939.

TRENTINI L. (1996): *Volume dell'alveolo e qualità della piantina in vivaio*, «L'Informatore Agrario», 29 (Suppl.), 47-62.

Dati Istat 2005 (<http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/fiori/flo42005.html>)

Dati Istat 2006 (<http://www.istat.it/agricoltura/datiagri/coltivazioni/anno2006/ital2006.htm>)

TESI DI LAUREA

ALAMPRESE L. (2006): *Aspetti morfologici e produttivi del cavolo broccolo (Brassica oleracea L. var. italica Plenck) in risposta alle modalità di trapianto*, Tesi di Laurea in Orticoltura. Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università degli Studi della Basilicata. Relatore: Prof. Vincenzo Candido. Anno accademico 2005/2006.

STASOLLA E. (2006): *Aspetti innovativi del vivaismo orticolo: produzione di piantine di melone*, Tesi di Laurea in Orticoltura. Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Tecnologie Agrarie (1° Livello), Università degli Studi della Basilicata. Relatore: Prof. Vito Miccolis. Anno accademico 2004/2005.

VERDEROSA G. (2007): *Contenitori innovativi per la preparazione di piantine di cavolo broccolo*, Tesi di Laurea in Orticoltura. Facoltà di Agraria, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie, Università degli Studi della Basilicata. Relatore: Prof. Vito Miccolis. Anno accademico 2005/2006.

